속효성 코/감/기/약

어린이 보호용
안전포장 도입!

속코정

일 반 의약품
분류번호 : 141

속코정은 기존의 코감기약(성분 : 염산트리프롤리딘 2.5mg, 염산슈도에페드린 60mg)에 해열진통소염제인 아세트아미노펜 500mg을 함유시켜, 발열 및 동통증세까지 수반한 코감기에 다른 해열진통소염제의 복용 없이 효과적으로 증상을 치유할 수 있는 코감기 약입니다

성 상

흰색의 장방형 필름코팅정

성분 · 함량

1정중
염산슈도에페드린(비피) ····· 60mg
염산트리프롤리딘(비피) ····· 2.5mg
아세트아미노펜(약전) ····· 500mg

효능 · 효과

감기, 급성 · 아급성 부비동염과 관련된 다음 증상의 완화
비충혈, 콧물, 재채기, 부비동통, 두통과 발열 증상. 건초열, 꽃가루 과민증, 알러지성 및 혈관운동신경성 비염을 포함하는 항히스타민제에 반응하는 알러지 상태

용법 · 용량

성인 및 12세 이상 : 1회 1정을 4~6시간마다 복용합니다.
24시간내에 4정을 초과하지 않습니다.
8세~12세 미만 : 약사나 의사의 지시에 따라 복용합니다.
65세 이상의 노인 : 약사나 의사의 지시에 따라 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않도록 하십시오.
1) 이 약(트리프롤리딘, 슈도에페드린 또는 아세트아미노펜) 또는 교감신경성아민류에 대한 과민증이 있는 사람
2) MAO저해제를 복용 중이거나 투여를 중지한지 2주 이내인 사람
3) 중증의 간 및 신기능 장애 환자
4) 중증의 고혈압 또는 중증의 관상동맥질환자
5) 잔뇨형성을 수반하는 배뇨장애 환자
6) 갑상선기능항진증 환자
7) 당뇨병환자
8) 협각성녹내장 환자
9) 임신 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람, 수유중인 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 항히스타민제의 진정작용은 중추신경계에 영향을 미치는 다른 약물들의 진정작용에 부가되어 나타나므로, 알코올 음료를 마시거나 수면제, 진정제, 정신병치료제 또는 중추신경 억제성 항히스타민제와 같은 약물을 병용하지 않도록 합니다.
2) 이 약을 비충혈제거제, 식욕억제제, 암페타민과 유사한 신경자극약 같은 교감신경흥분제 또는 MAO억제제와 병용할 경우 때때로 혈압상승을 유발할 수 있으므로 병용하지 마십시오.
3) 이 약은 슈도에페드린을 함유하여 브레틸리움, 베타니딘, 구아네티딘, 데브리소퀴닌, 메칠도파, β 또는 α-아드레날린성 차단제를 포함하는 교감신경활성을 억제하는 약물들의 혈압강하작용을 부분적으로 역행시킬 수 있으므로 병용하지 않도록 합니다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
1) 작업상의 위험 : 이 약을 투여하는 사람은 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하고 약물에 대한 반응이 확정될 때 까지는 차량을 운전하거나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의해야 합니다.
2) 수유 : 이 약(염산슈도에페드린 및 염산트리프롤리딘)은 수유부에서 모유를 통하여 분비된다고 보고되어 있습니다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   1) 전립선비대로 인한 배뇨곤란 환자
   2) 고혈압 환자 및 관상동맥질환 환자
   3) 울혈성 심부전 등 심질환 및 부정맥 환자
   4) 당뇨병 및 갑상선기능항진증 환자
   5) 안내압상승 환자 또는 폐쇄각녹내장 환자
   6) 천식환자
   7) 7세 이하의 소아

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
   1) 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 부정맥, 안면창백, 저혈압을 수반한 심혈관 허탈
   2) 정신신경계 : 진정, 졸음, 편두통, 두통, 어지러움, 불안, 긴장, 발한, 무력감, 허약, 불면, 환각, 경련, 중추신경계 흥분 또는 억제 등 특히 소아에서 흥분이 나타날 수 있습니다.
   3) 소화기계 : 변비, 구역, 구토, 소화장애 등
   4) 과민증 : 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감, 발진 등 슈도에페드린에 의한 고정약진(fixed drug eruption)과 트리프롤리딘에 의한 태선양피부발진 (lichenoid skin eruption)이 드물게 나타날 수 있습니다.
   5) 비뇨기계 : 때때로 뇨저류
   6) 기타 : 구갈, 발한 등

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항은 아래와 같습니다.
   1) 5일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 3일 이상 고열을 동반한 때에는 연용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   2) 슈도에페드린 60mg을 복용한 후 혈압이 정상인 사람에서 혈압상승과 의식소실이 보고된 바 있으며 이러한 사례는 매우 드문 슈도에페드린 불내성(intolerance)의 례로 간주됩니다.

8. 과량 복용시의 처치
   이 약을 과량 복용한 경우 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증, 호흡억제 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광카테터 삽입법을 시행합니다. 슈도에페드린 제거를 위해서 투석하도록 합니다.
   이 약을 권장량 이상으로 복용한 경우 심각한 간손상이 야기될 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
   2) 직사일광을 피하고 가능한한 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저 장 방 법 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

포 장 단 위 6정

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0612-02

포장 개봉 방법



※앞부분을 위에서 강하게 눌러 호일로 부터 알약을 꺼냅니다.

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr