

중추성 근이완제

# 에 렉 신 정

(Eperisone HCl 50mg)

Elexin Tab.

**에**렉신정은 염산에페리손 50mg 제제로 척수레벨에서 작용하는 중추성 근이완제입니다. 에렉신정은 척수레벨에서의 근이완작용과 통증유발물질을 억제하는 작용으로 요통, 건관절 주위 염증 등 근골격계 질환 및 수술 및 외상 후유증에 수반되는 근육 긴장과 통증을 완화시켜줍니다. 또한 혈관이완작용이 있어 뇌혈관장애, 척수혈관장애 등에 수반되는 경련성 마비증상의 치료에 효과적으로 사용되고 있습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

염산에페리손(별규) ..... 50mg

【성 상】

백색원형의 당의정제

【효능 · 효과】

1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경건완증후군, 건관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술 후유증(뇌 · 척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 축색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법 · 용량】

성인 : 염산에페리손으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약에 과민증 환자
  - 2) 중증의 근무력증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
  - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다)
  - 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
  - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
  - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
  - 6) 정신신경계: 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
  - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
  - 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
  - 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.
  - 10) 기타 : 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
  - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
  - 2) 졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 

이 약의 유사약품인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
  - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
 

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
8. 고령자에 대한 투여
 

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

  - 1) 이 약에 과민증 환자
  - 2) 결핵환자
  - 3) 임부, 수유부
  - 4) 황에 불내성인 환자

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 사용기간 : 3년

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



**한국유텍스제약(주)**  
경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수약품제조관리기준  
**KGMP**적격지정업체

설명서 작성일 : 070601