뮤레스캡슐
(에르도스테인)

MULESS CAPSULE
(Erdosteine)

의 약 품 분류번호	222
	전문의약품

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

에르도스테인(별규) ····· 300mg

■ 성 상

흰색 내지 미백색의 분말 또는 과립이 충전된 상부 초록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과

급 · 만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

■ 용법 · 용량

1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
   1) 동성분에 과민증이 있는 환자
   2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자

2. 이상반응
   1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났다.
   2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

3. 상호작용
항생제, 기관지확장제(테오필린, β2-효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.

4. 임부 · 수유부에 대한 투여
임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

■ 포장단위

자사포장단위

■ 저장방법

밀폐용기,실온보관(1~30℃)

■ 첨부문서 작성연월일

2007. 05. 01

*만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 유통 과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

*이 첨부 문서 작성 일자 (2007년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.cwsy.co.kr 이나 개발부 (02)2109-3300, 클로바서비스 080-652-0213에서 확인하실 수 있습니다.

MUC-1-A

제조의뢰자 : 중외신약
경기도 평택시 모곡동 441-8
제 조 자 : 대원제약(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 903-1