만성간염치료제

리바텍정

(비페닐디메칠디카르복실레이트)

리바텍정은 오래전부터 간질환에 널리 사용되어온 오미자의 열매(Schizandrae Fructus)로부터 추출된 유효성분 Schizandrin C와 유사한 구조를 가지는 합성 동족체인 비페닐디메칠디카르복실레이트(Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate, DDB : Diphenyl Dimethyl Bicarboxylate)를 주성분으로 하는 제제입니다.
리바텍정은 간장 질환의 진단 및 치료시 지표가 되는 ALT의 혈중농도를 정상화시키는 등 간기능 개선효과를 나타내고, 간의 해독 효소계인 cytochrome P450을 유도하여 약물 및 독성물질을 불활성화하여 만성간염치료에 우수한 효과를 나타내는 제제입니다.
리바텍정은 투여 후 1,2,3개월에 각각 71.4%, 78.9%, 89.5%의 간염환자에서 ALT수치가 정상화 되었고, 간염환자들이 자주 호소하는 통증, 피로, 복부팽만, 식욕감퇴 등의 증상을 크게 개선하여 주었으며, 3-6개월 이상 장기투여 시에도 부작용이 경미하게 나타나는 안전성과 유효성이 입증된 제제입니다.

【원료약품 및 분량 : 1정중】
비페닐디메칠디카르복실레이트(별규)……25mg

【성　　상】 백색의 장방형 정제

【효능 · 효과】 지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트란스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

【용법 · 용량】
성인 : 비페닐디메칠디카르복실레이트로서 1회 25~50mg, 1일 3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 만성 활동성 간염 환자
   2) 간경변 환자
2. 이상반응
   1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
   2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달치료제를 병용 투여하면 소실된다.
   3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.
3. 상호작용
   이노신(Inosine)과 함께 투여시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
   임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.
5. 소아에 대한 투여
   소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.
6. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
7. 임상검사치에의 영향
   치료중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣080-311-2222

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 작성일자(2004년 12월)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr)또는 전화 (031)550-0474-8 (주)일화/학술 · 개발부를 통해 확인할 수 있음

작성년월 : 2004년 12월

ILHWA Ph.
경기도 구리시 수택동 437
http://www.ilhwa.co.kr