

[원료약품의 분량] 1 캡슐 중

염산플루옥세틴 (유.에스.피) 22.4mg
(플루옥세틴으로서 20mg)

[성상] 백색 내지 회백색의 분말을 함유한 상·하부 미황색의 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 우울증

- 1) 이 약의 효과는 DSM-III 범주의 우울증과 매우 유사한 것으로 진단 받은 우울증 외래환자의 치료시 5~6주 이내에 나타났다. 우울증은 보통 일상 기능을 방해하는 정도로 현저한 지속적인 우울상태 또는 불쾌감(최소한 2주간 거의 매일)을 말하며 최소한 다음 8가지 증상 중 4가지 이상을 포함해야 한다. : 식욕의 변화, 수면의 변화, 정신운동의 격정 또는 지둔, 일상생활에 흥미의 결여 또는 성적 욕구의 감소, 피로감의 증가, 죄의식 또는 쓸모 없다는 느낌, 사고의 둔화 또는 집중력의 저하, 자살사도 또는 자살에 대한 생각
- 2) 입원한 우울증 환자에 대한 이 약의 항우울 작용은 지금까지 적절히 연구되지 않았으며 5~6주 이상 장기 투여에 대한 유효성은 대조 시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기 투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유효성을 정기적으로 재평가한다.
2. 신경성 식욕과항진증
이 약은 위약 투여군과 비교했을 때 탄식과 사해행동에서 유의성 있는 감소를 나타냈다. 이 약의 16주 이상 장기투여에 대한 유효성은 대조 시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유효성을 정기적으로 재평가한다.
3. 강박반응성 질환
이 약은 이중맹검, 위약대조 임상시험에서 강박반응성 질환의 증상을 유의성 있게 감소시켰다. 강박관념 또는 강박행위를 갑자기 경감하게 되고, 개인의 사회생활 또는 직장 생활이 상당히 고통스럽게 되며 시간을 소비하게 되거나 상당히 방해받게 된다. 이 약의 13주 이상 장기투여에 대한 유효성은 대조시험을 통해 체계적으로 평가되지 않았으므로 장기투여할 경우에는 개개 환자에 대한 유효성을 정기적으로 재평가한다.
4. 월경전 불쾌장애
월경 전 불쾌장애 증상은 우울, 불안, 정서적 불안정과 같은 증상이 뚜렷하고, 증상들이 주기적(월경주기에서 황체기의 마지막주)으로 나타나고 월경이 시작되면 며칠 이내에 없어진다. 이러한 증상들은 사회적 역할 및 직업수행 능력에 지장을 주어 육체적 증상인 유방통증, 두통, 관절통, 또는 근육통, 복부팽만감, 체중증가 등을 수반한다. 일반적인 월경전 긴장 및 항우울제 치료로 인한 주기적인 정신적 장애는 월경전 불쾌장애 증상에서 제외한다. 이 약을 6개월이상 장기 사용하였을 때의 유효성에 대해서는 아직 체계적으로 평가되지 않았다. 따라서 이 약을 장기간 사용하고자 하는 여성은 각각의 환자에 대하여 장기간 사용시의 유효성에 대하여 정기적으로 재평가하여야 한다.

[용법·용량]

● 성인

1. 우울증

- 1) 초기치료 : 초회량으로 플루옥세틴으로서 1일 1회 20mg을 오전에 경구투여한다. 대조임상시험에서 1일 20~80mg의 용량이 투여되었다. 만일 개선이 관찰되지 않을 경우에는 1주일 후에 용량의 증가를 고려할 수 있다. 1일 20mg을 초과하는 용량은 1일 2회(아침, 정오)투여해야 하며 1일 80mg의 최대 용량을 초과해서는 안된다. 충분한 항우울 효과를 발현은 치료 4주 후 또는 그 이상까지 지연될 수 있다.
- 2) 유지/지속/연장치료 : 환자가 이 약에 얼마의 기간동안 치료를 받아야 하는지에 대한 확실한 자료는 없지만 정신약 물학자들 사이에서 우울증의 급성 징후들은 수 개월 또는 그 이상의 약물 치료를 필요로 한다는 것이 인정된다. 증상의 경감에 필요한 항우울제의 양이 안정을 유지 또는 지속하는데 필요한 양과 동일함이라는 알려지지 않았다.

2. 신경성 식욕과항진증

이 약으로서 1일 60mg을 투여한다. 1일 투여량은 80mg을 초과하지 않는다. 치료시작 전에 전해질 농도를 측정한다.

3. 강박반응성 질환

이 약으로서 1일 20~60mg을 투여한다. 1일 투여량은 80mg을 초과하지 않는다.

4. 월경전 불쾌장애

이 약으로서 1일 20mg을 투여한다. 6개월간 치료한 후 지속적인 치료가 필요한지 재평가한다.

- **신장 및/또는 간손상 환자, 여러 약물을 투여받고 있는 환자, 고령자 및 병발질환이 있는 환자 : 저용량을 투여하거나 투여횟수를 줄인다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.**

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 중증의 신부전 환자(사구체 여과율 < 10ml/min)
- 3) MAO 억제제를 투여중인 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 간질발작의 병력이 있는 환자(불안정형 간질 환자에게는 투여를 피하고 조절 가능한 간질 환자의 경우에는 투여 후 주의 깊게 관찰하며 간질이 악화되는 경우에는 투여를 중지한다.)
- 2) 자살의 소인이 있는 환자(자살기도의 가능성은 우울증 환자에 고유한 것으로 우울증상이 현저히 감소될 때까지 나타난다. 최초 약물치료시에는 위험성이 높은 환자에 대해 세심한 감독이 있어야 하며 과량 투여의 위험을 줄이기 위해 환자를 양호하게 유지할 수 있는 최소유효량이 처방되어야 한다.)
- 3) 병발질환이 있는 환자
 - ① 전신적인 병발질환환자(대사 또는 혈액학에 영향을 줄 수 있는 질병 및 신체조건을 가지고 있는 환자에 대한 임상상은 사용상 주의가 요망된다.)
 - ② 최근의 심근경색 또는 불안정형 심질환의 병력이 있는 환자(충분한 평가가 없었고, 이러한 진단을 받은 환자는 임상 시험에서 제외되었으나 이중맹검시험에서 이 약을 투여받은 312명 환자의 심전도 평가시 심장기능불리를 야기하는 전도이상은 관찰되지 않았으며 평균 심박동은 대략 3회/분(1.4%) 감소되었다.)
 - ③ 간경변 환자(이 약 및 그 활성 대사물인 노르플루옥세틴의 소실률이 감소되어 반감기가 증가되기 때문에 저용량을 투여하거나 투여빈도를 줄인다.)
 - ④ 중증의 신손상 환자 (이 약은 충분히 대사되어 약물이 변화되지 않은 상태로 요중 배설되는 경우는 적지만 중증의 신손상 환자에 장기간 투여할 경우에는 주의한다.)
 - ⑤ 당뇨병 환자(이 약은 당의 조절에 변화를 줄 수 있어 치료중에 저혈당증이 나타났으며 약물투여를 중지함에 따라 발전되었다. 당뇨병 환자에 다른 여러 종류의 약물이 투여될 때와 마찬가지로 이 약의 투여개시 또는 중지시에 인슐린 또는 경구용 혈당강화제의 용량조절이 필요하다.)

3. 이상반응

- 1) 일반적으로 불안, 신경과민증, 불면증 등의 신경계 장애, 졸음, 피곤, 무력증, 진전, 발한, 식욕부진, 구역 및 설사를 포함하는 위장관 장애, 어지러움 또는 두통 등이 나타날 수 있다.
- 2) 투여중지와 관련된 이상반응 : 이 약을 투여받은 약 4,000명의 환자 중 15%의 환자가 신경과민증, 불안 및 불면증 등 정신신경계(5.3%), 구역 등 소화기계(3.0%), 어지러움 등 신경계(1.6%), 무력증 및 두통 등 전신(1.5%), 발진 및 가려움 등 피부(1.4%)이상반응으로 인해 투여를 중지했다.
- 3) 발진 및 이에 수반되는 이상반응 : 이 약을 투여한 5,600명의 환자 중 대략 4%에서 발진 및 (또는) 두드러기가 나타났다. 이 경우 중 대략 1/3에서 발진 및(또는)발진과 연관되어 열, 백혈구 증가, 관절통, 부종, 팔목터짐증후군, 호

흡곤란, 림프선종, 단백뇨 및 경미한 트랜스아미나제 증가가 나타났다. 대부분의 환자들은 이 약의 투여 중지 및 (또는) 항히스타민제, 스테로이드제에 의한 보조치료로 신속히 개선되었으며 이러한 이상반응을 경험한 모든 환자는 완전히 회복된 것으로 보고되었다. 판매 이전의 임상 연구에서 2명의 환자는 중증의 전신 피부질환이 나타난 것으로 알려졌는데 두환자에 대한 영묘한 진단은 없었으나 1명은 백혈구 파괴성 백관염, 다른 1명은 맥관염 또는 다형홍반으로 여겨지는 중증의 발진 증상으로 생각되었다. 다른 여러 환자들은 혈청 질환을 일으키는 전신 증상을 나타냈다. 이 약 시판 이후 맥관염과 관련되었을 가능성이 있는 전신적인 이상반응이, 발진을 보인 환자에서 나타났다. 이러한 이상반응들은 드물게 나타났지만 심각할 수 있으며 폐, 심장 또는 간장 등에서 나타났다. 이러한 전신적 이상반응과 관련하여 사망이 발생하는 것으로 보고되었다. 기관지경련, 맥관부종 및 단독 또는 병발된 두드러기를 포함하는 과민성 반응이 보고되었다. 변화되는 조직병리 및(또는) 섬유증의 감염과정을 포함하는 폐사에서의 반응이 드물게 보고 되었는데 유일한 전구 증상으로 호흡곤란증을 나타냈다. 이러한 전신적인 반응 및 발진이 공통적으로 내재된 원인을 가지고 있는지 또는 서로 다른 병인 또는 병리학적 과정에 기인하는 것인지는 알려지지 않았으며 특별히 내재된 면역학적 원인은 확인되지 않았다. 이러한 병인이 밝혀지지 않은 발진 또는 다른 알레르기 현상이 나타났면 이 약의 투여는 중지되어야 한다.

- 4) 불안 및 불면증 : 불안, 신경과민증 및 불면증이 환자의 10~15%에서 보고 되었으며 이 약 투여환자의 5%에서 투여중지의 원인이 되었다.
- 5) 식욕 및 체중의 변화 : 현저한 체중의 감소가 특히 체중 미달의 우울증 환자에서 나타날 수 있다. 이 약 투여 환자의 약 9%가 식욕감퇴를 경험했는데 이 발현율은 위약 투여 환자의 약 6% 정도였다. 5% 이상의 체중감소가 위약 투여 환자의 4% 및 삼함계 항우울약 투여 환자의 3%에 비해 이 약 투여 환자에서는 13%로 나타났으나 체중감소로 인하여 투여를 중단한 환자는 극히 드물었다.
- 6) 조동 및 경조동의 활성화 : 이 약 투여 환자의 약 1%에서 경조동 또는 조동이 나타났는데 조동 및 경조동의 활성화는 다른 항우울약으로 치료받는 환자의 일부에서도 보고되었다.
- 7) 간질 발작 : 이 약을 투여받은 6,000명의 환자 중 12명이 경련(간질발작)을 나타냈는데 이는 0.2%로써 다른 항우울약에서와 같았다.
- 8) 제나트륨혈증 : 제나트륨혈증(일부는 혈청 나트륨 농도가 100mmol/L 이하)이 보고 되었다. 이 약 투여를 중지하면 제나트륨혈증은 회복되는 것으로 나타났다. 이러한 경우들은 변화되는 가능한 병인들과 관련하여 복잡하지만 일부는 항이노호르몬비 이상 증후군(Syndrome of Inappropriate ADH)에 기인하는 것으로 생각할 수 있다. 이러한 경우의 대부분은 고령자 및 이노제 투여 환자 또는 용적부족인 환자에서 나타났다.
- 9) 혈소판 기능 : 이 약을 투여받은 환자에서 검사실 검사를 통해 변화된 혈소판 기능 및 (또는) 비정상적인 결과가 드물게 보고 되었다. 이 약을 투여받은 수 명의 환자에서 비정상적인 출혈에 대한 보고가 있지만 이 약에 의한 영향 인지는 확실하지 않다.
- 10) 대조임상 시험에서의 이상반응 발생률 : <표1>에 이 약과 위약을 비교하기 위한 대조시험에 참가한 이 약 투여 환자에서 1% 이상의 빈도로 발생한 이상반응을 열거했다. 본 임상시험과 환자의 특성과 기타 인자들이 다른 치료의 경우 이상반응 발생률을 예측하기 위해 이 수치들이 사용될 수 없으며 인용된 빈도는 다른 요법 및 다른 연구자에 의한 임상연구로부터 얻어진 수치와 비교할 수 없다. 하지만 인용된 빈도는 이상반응 발생률에 대한 약물의 인자의 상관성을 측정하는데 다소 참고될 수 있다.
- 11) 기타의 이상반응 : 임상시험 기간 중 약 5,600명의 환자에게 여러 용량으로 이 약이 투여되었다. 나타난 이상반응들은 임상 연구자들이 스스로 선택한 단어로 표기하였으며, 표준화된 범주를 사용하여 이상반응들을 유사한 형태의 것으로 분류함으로써 이상반응을 경험한 환자의 비율을 예측할 수 있었다. 보고된 이상반응을 분류하기 위해 표준 COSTART 사전의 단어가 사용되었다. 아래에 나타난 빈도는 5,600명 중 1%이상 나타난 이상반응 비율을 나타낸 것이며 보고된 이상반응은 표에 열거된 것. COSTART 사전의 단어가 너무 일반적이 것 및 약물의 관련성 이 큰 것을 제외하고는 모두 포함되었으며 신체 각 부위별로 1건(0.1%), 2건(0.1~0.1%), 3건(0.1%)으로 다음과 같이 구분되었다.

①전신

1군 : 냉감

2군 : 냉감 및 발열, 남포, 안면부종, 수척, 턱의 통증, 불쾌감, 목의 통증, 목의 경직, 요통

3군 : 복부확장, 붓고자짐, 수두증, 저온증, 홍반성 낭창, 모닐리아증, 혈청질환

②순환기계

1군 : 협심증, 부정맥, 출혈, 고혈압, 저혈압, 편두통, 체위성 저혈압, 실신, 빈맥

3군 : 1도 방실결절, 사맥, 각자단, 뇌허혈, 심근경색, 혈전성 정맥염, 맥관성 두통, 심실성 부정맥

③소화기계

1군 : 식욕증가

2군 : 아프타성 구내염, 삼킴곤란, 트림, 식도염, 위염, 치은염, 설염, 간기능검사 이상, 흑독증, 구내염, 갈증

3군 : 혈변, 담낭염, 담석증, 대장염, 심미지장계장, 장염, 변실금, 토혈, 간염, 간종, 과산화, 타액분비증가, 황달, 간

연하, 구강장애 타액선확장, 위궤양, 혀의 탈색, 허부종, 특이체질성 간염

④내분비계

2군 : 갑상선기능저하증

3군 : 갑상선종, 갑상선기능항진증

⑤혈액 및 림프계

2군 : 빈혈 및 림프선종

3군 : 출혈시간 증가, 혈액질환, 백혈구 감소, 림프구 증가, 정성출혈, 자반, 침강 속도 증가, 혈소판 혈병

⑥대사 및 영양

1군 : 체중감소

2군 : 전신부종, 저혈당증, 말초부종, 체중증가

3군 : 탈수, 통풍, 고콜레스테롤혈증, 고혈당증, 고지혈혈증, 저혈당반응, 저칼륨혈증, 제나트륨혈증, 혈결핍성 빈혈

⑦근골격계

2군 : 관절염, 뼈의 통증, 정맥낭종, 건조염 및 연축

3군 : 골괴사, 연골염양양증, 근육통, 근염, 골다공증, 병변골절, 류마티스성 관절염

⑧신경계

1군 : 비정상적인 꿈 및 격정

2군 : 비정상적 보행, 급성 뇌증상, 장시간 정좌불능증, 강박증, 감정둔마, 운동 실조증, 협실증상, 중추신경계 자극, 경련, 망상, 인종, 정서불안, 다형증, 환각, 적의, 운동과다증, 감각각각, 협소불보, 상용증가, 조동반응, 신경통, 신경염, 편집병적 반응, 정신병, 어지러움

3군 : 비정상적 파파, 반사회적 행동, 만성 뇌증상, 입주위의 감각이상, 중추신경계 억제, 혼수, 구음장애, 근긴장이상, 추체외로 증상, 긴장형진, 히스테리, 긴대성 근경련, 안구진탕증, 마비, 반사 감소, 혼미, 사경

⑨호흡기계

1군 : 기관지염, 비염 및 하품

2군 : 천식, 비출혈, 딸꾹질, 과호흡 및 폐렴

3군 : 무호흡, 객혈, 저산소증, 후두부종, 폐부종, 폐성유증/폐포염, 흉각 심출액

⑩피부

2군 : 여드름, 원형탈모증, 접촉성 피부염, 피부건조, 단순포진, 반점성 구진, 두드러기

3군: 습진, 다형성 홍반, 진균성 피부병, 대상포진, 조모증, 건선, 자색발진, 농포발진, 지루, 피부 탈색, 피부 과영양, 피부결함, 수포성발진

④감각계

2군: 약시, 결막염, 귀의 통증, 안구통증, 동공확대, 광과민증, 이명
3군: 안검염, 백내장, 각막손상, 난청, 복시, 안구출혈, 녹내장, 홍채염, 안검 하수, 사시, 미각손실

⑤비뇨생식기계

2군: 비정형성 사정, 무월경, 유방통, 방광염, 배뇨장애, 섬유성 낭포성 유방, 발기부전, 백대하, 폐경, 월경과다, 난소이상, 요실금, 요저류, 요근강, 배뇨손상, 질염
3군: 유산, 난배배, 유방확장, 이상성감각, 부고환염, 유루증, 협소, 과소월경, 신장결석, 자궁출혈, 고환염, 다뇨, 신우신염, 뇨뇨 난관염, 요도통증, 요도염, 요로계 이상, 요석증, 자궁출혈, 자궁경증, 질출혈

⑥기타

시판 이후 일시적이고 이 약과의 인과성이 불명확한 이상반응으로 재생불량성 빈혈, 뇌혈관이상, 혼돈, 운동장애(1 예로서 이 약을 5주간 투여받은 77세의 여성환자에서 불수의적 허의 돌출로 인한 볼과 허의 자작성 증후군으로 이약의 투여를 중단한 후 몇 달 이내에 완전히 소실되었음), 반상 출혈, 호산구증가상배열, 위장관출혈, 고콜레스테롤혈증, 면역결핍 용혈성 빈혈, 기존의 운동장애의 악화 및 이러한 증상과 관련된 있는 약물로 인한 운동장애, 새로 도인 증후군, 핵장염, 범혈구감소증, 자살에 대한 생각, 혈소판감소증, 혈소판감소성 자반증, 투약중지 이후의 질출혈 및 과격한 행동, 광과민증 등이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 및 대사의 긴 반감기: 이 약(2~3일) 및 주 대사물(7~9일)의 반감기 때문에 용량 변화시에도 수주일간은 충분히 반영되지 않는데, 이는 최종용량의 결정 및 치료 종료에도 영향을 미친다. (용법·용량항 참조)
- 2) 인식 및 운동수행의 방해: 정신신경계 약물은 판단, 사고 또는 행동수행에 손상을 줄 수 있기 때문에 약물이 이상 반응을 나타내지 않는 것이 확실할 때까지 자동차운전 등 위험한 기계 조작시에는 주의해야 한다.
- 3) 환자에 대한 정보: 이 약은 판단, 사고 또는 행동수행에 손상을 줄 수 있기 때문에 환자가 수행에 영향을 받지 않는다고 판단될 때까지 자동차운전 또는 위험한 기계조작을 피하도록 해야 하며 만일 환자가 일반용약물 또는 알코올을 섭취하고자 할때는 의사에게 알리도록 하고 만일 환자가 치료기간 중 임신을 했거나 임신을 원할 경우 및 수유중이거나 임신 또는 두드러기나 나타났을 경우에는 의사에게 알리도록 한다.
- 4) 검사실검사: 특별히 권장되는 검사사항은 없다.
- 5) 발암성, 변이원성, 수태물손상: 이 약에 의한 발암성, 변이원성, 수태물 손상에 대한 증거는 없다. 인체 최대용량(80mg)의 7.5~9배에 해당하는 용량을 식이요법으로 2년간 랫트에 투여했을 때 발암성이 나타나지 않았다. 이 약 및 노르플루옥세틴은 박테리아변이시험, 배양된 랫트의 간세포에서의 DNA보수시험, 랫트의 림프종시험 및 차이나이스 헬스터의 골수세포에 대한 자염색체 교환시험에서 유전독성을 나타내지 않았다. 랫트에 인체 최대용량의 약 5배 및 9배를 투여했을 때 수태물에 대한 영향은 없었다. 신생아 생존율의 미미한 감소는 모체의 음식물소비 감소 및 체중증가의 약화와 관련되어 있다.
- 6) 동물실험에서의 독성: 이 약을 장기적으로 투여받은 마우스, 랫트 및 개의 일부조직에서 인지질이 증가되었는데 치료중지후 가역적인 것으로 나타났다. 동물에서 인지질의 축적은 펜돌루라민, 이미프라민 및 라니티딘을 포함하는 많은 양이온성 양성 약물사용시 관찰되었는데 인체에서의 이러한 효과의 의미는 알려지지 않았다.
- 7) 신체적 및 정신적 의존성: 동물 및 인체에 대해 남용 가능성, 내성, 신체적 의존성 등이 체계적으로 연구되지 않았다. 임상시험에서 금단증후군 또는 약물 추구행동이 드러나지 않았지만 이러한 관찰이 체계적인 것이 아니고 또한 이러한 제한된 경험에 근거하여 중추신경계 작용 활성약물이 일단 사면되었을 때 오용, 유용 또는 남용이 어느 정도가 될지를 예측하는 것은 불가능하다. 따라서 환자가 과거에 약물 남용의 경험이 있는지를 확인하여 하고 약물의 남용 및 오용하는 징후(내성발현, 용량증가, 약물추구행동)가 있는지를 세심하게 관찰, 추적한다.
- 8) 월경전 불쾌장애에 대한 치료효과는 우울증의 치료와는 달리 매우 신속하게 나타나서 치료 첫 주기에 일반적으로 증상이 개선된다. 임상시험 결과, 치료를 중단한 후 보통 1~2주 이내, 신속하게 증상이 다시 나타나는 경향이 있는 것으로 알려졌다. 월경전 불쾌장애에 대한 치료를 시작하기 전에 이 약의 복용에 대한 유익성과 위험성을 환자에게 충분히 알려주어야 한다. (서방캡슐 제외)

5. 상호작용

다른 약물과 마찬가지로 여러가지 기전(약동학적 및 약역학적 억제와 증강)에 의해 상호작용의 가능성이 있다.

- 1) MAO저해제: 이 약과 MAO저해제를 병용투여한 경우 및 이 약의 투여를 중지하고 MAO저해제를 투여한 경우에 망상 및 혼수상태로 진행되는 극도의 격앙상태를 포함한 정신상태의 변화와 활력증상의 급속한 변화로 인한 내인성 반응들이 보고된 바 있다. 몇몇의 사례에서 새로도민증후군이 나타난 바 있으므로 이 두 종류의 약물은 병용투여하지 않는다. MAO 저해제의 투여중지후로부터 이 약에 의한 활성대사물의 긴 반감기 때문에 이 약 투여중지후로부터 MAO 저해제에 의한 치료개시 사이에는 최소한 5주가 경과되어야 한다.
- 2) 트립토판: 이 약과 트립토판을 병용투여한 5명의 환자에서 격정, 불안정 및 위장관계 불편이 보고되었다.
- 3) 기타 항우울약: 다른 항우울약과 병용투여했을 때 다른 항우울약의 안정된 혈장농도의 두배 이상의 증가가 나타났다.
- 4) 리튬: 이 약과 리튬의 병용투여시 리튬농도의 증가, 감소 및 리튬독성의 예가 보고되어 있으므로 이러한 경우에는 리튬의 농도를 주의깊게 관찰한다.
- 5) 디아제팜 침술: 일부 환자에서 병용투여한 디아제팜의 반감기가 연장될 수 있다.
- 6) 혈장단백결합률이 높은 약물과 병용투여시의 잠재적 효과: 이 약은 혈장단백에 강하게 결합하기 때문에 단백질결합률이 높은 다른 약물(쿠마딘, 디기톡신 등)을 투여받고 있는 환자에 대한 투여는 혈장 농도의 변화를 방지하고 이상반응을 나타낼 수 있으면 역으로 이 약이 강하게 결합하는 다른 약물로 대체되었을 경우에도 마찬가지이다.
- 7) 중추신경작용 약물: 이 약과 다른 중추신경작용 약물의 복합사용시 위험성은 체계적으로 평가되지 않았으므로 이러한 약물과 병용투여시에는 주의가 요망된다.
- 8) 전기경련요법(ECT): 전기경련요법(ECT)과 이 약 병용의 유익성에 대한 임상연구는 없으며, 이 약을 투여받으면서 전기경련요법을 받은 환자에서 지속적인 발작이 드물게 보고되었다.
- 9) 시토크롬 P450 2D6 동종효소에 의하여 대사하는 약물: 이 약은 시토크롬 P450 2D6 동종 효소를 저해할 가능성이 있으므로, 시토크롬 P450 2D6에 의하여 현저하게 대사되는 약물 및 상대적으로 좁은 치료역을 가진 약물과 병용투여하는 경우, 만일 환자가 이 약을 병용투여하거나 5주 전부터 투여를 시작하였다면, 치료용량의 저용량부터 치료를 시작하여야 한다. 만일, 그러한 약물을 투여하고 있는 환자에게 이 약이 추가로 투여된다면, 원래 투여하고 있던 약물의 용량을 감소하는 부분에 대해 고려할 필요가 있다.
- 10) 와르파린: 이 약과 와르파린을 함께 투여하였을 때 일관된 양상은 아니지만 출혈의 증가와 함께 변형된 항응고 작용(실혈상치 수치 또는 임상적 증상과 증후)이 드물게 보고되었다. 와르파린을 다른 약물과 병용투여할 때 신중해야 하는 것과 마찬가지로, 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 응고 작용에 대해 주의깊게 모니터링해야 한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험(랫트와 토끼에 인체의 1일 최대용량(80mg)의 9배 및 11배 투여)에서 태자손상의 증거는 없었다. 임부에 대해 적절히 시행된 임상시험은 없었으며 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 명백히 필요한 경우를 제외하고는 투여를 피한다.
- 2) 인체에서의 분만 및 출산에 대한 효과는 알려지지 않았다.
- 3) 이 약은 모유중으로 이행되므로 투여중에는 수유를 중단한다. 1예의 모유 샘플에서 플루옥세틴과 노르플루옥세틴의 농도가 70.4ng/mL였고 모체의 혈장 농도는 295.0ng/mL였으나 유아에 대한 이상반응은 보고되지 않았다. 다른 1예(유아의 혈장플루옥세틴과 노르플루옥세틴 농도 각각 240ng/mL, 208ng/mL)에서 유아에 대한 이상반응으로

울음, 수면장애, 구토, 똥변 변 등이 보고되어 있다.

7. 소아에 대한 투여

소아(18세 이하)에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자의 사용에 대해서는 충분히 평가되지 않았지만 연령과 관련된 이상반응은 발견되지 않았다. 그러나 병발질환이 있거나 다른 약물을 병용투여하는 고령자에서 연령과 관련된 이상반응은 배제할 수 없다.

9. 과량투여시의 처리

- 1) 인체: 1987년 12월까지 이 약을 단독 또는 다른 약물 및(또는) 알코올과 병용하여 급성으로 과량투여한 대략 38예 중 2예의 사망이 있었다. 1예의 사망에서는 대략 약 1,800mg과 미확인된 양의 마프로틸린을 병용한 예였는데 이 약의 혈장 농도는 4.75mg/L였고 마프로틸린의 혈장 농도는 4.18mg/L였다. 또 다른 1예의 사망에서는 3종류의 약물이 포함되었는데 플루옥세틴 1.93mg/L, 노르플루옥세틴 1.10mg/L, 코데인 1.80mg/L과 테아제팜 3.8mg/L의 혈장 농도를 나타냈다. 이 약 3,000mg을 투여한 또 다른 1명의 환자는 특별한 항진전제에 의한 치료없이 자연적으로 소실된 대발작을 경험했는데 실제로 흡수된 약물의 양은 구토에 의해 줄었다. 이 약 고용량을 포함하는 과량 투여시 구역과 구토가 현저하게 나타났으며 다른 현저한 증상들은 격정, 불안정, 경조증, 흥분 내지 혼수에 이르는 중추신경계 이상, 증상을 뚜렷하게 보이지 않는 부정맥 내지 심박동정지에 이르는 심혈관계 기능 이상, 폐기능 이상 등이었다. 위에 언급된 2예의 사망을 제외하면 다른 과량투여의 경우는 후유증이 없이 회복되었다. 시판 이후 이 약만의 과량투여로 인한 사망은 극히 드물었다.
- 2) 동물실험: 동물에서의 연구는 인체에서의 과량투여시처치에 대해서 정확하게 적절히 유효한 정보를 제공하기는 하지만 동물시험에서의 경험은 가능한 치료방법에 대한 유용한 통찰력을 제공한다. 랫트와 마우스에 대한 과량투여 시 LD₅₀는 각각 452mg/kg와 248mg/kg이었으며 여러 종의 동물에 고용량을 경구투여했을 때 과도한 불안정 및 경련이 나타났다. 이 약을 고의적으로 과량투여한 6마리의 개에서 5마리가 대발작을 나타냈는데 표준수의 용량인 디아제팜을 정맥으로 주입한 직후 발작이 중지되었는데 이 발작을 일으키는 최소 혈장 농도는 1일 80mg을 장기적으로 투여받은 사람에서 나타나는 최대 혈장 농도의 2배였다. 별도의 단일용량 투여 연구에서 고용량이 투여된 개의 심전도에서 PR, QRS 또는 QT 기간의 연장이 나타나지 않았고 빈맥 및 혈압의 상승이 관찰되었다. 결과적으로 심독성을 예측하는데 있어서의 심전도의 가치는 알려지지 않았지만 인체에서의 과량투여의 경우에 심전도는 정상적으로 측정되어야 한다.
- 3) 과량투여시의 처리: 기도를 확보하고 적절한 산소공급과 호흡을 유지해야 하며 활성탄을 단독 또는 소르비톨과 병용하는 것이 구토 및 위세척보다 더욱 효과적일 수 있다. 통상적인 대증요법 및 보조요법과 함께 심장 및 활력증후의 측정이 권장된다. 동물시험에 의하면 자발적으로 소실되지 않는 발작은 디아제팜에 반응을 보일 수 있다. 이 약에 경제배뇨, 투석, 혈액투석 및 교환수주는 별로 도움이 되지 않는다. 과량투여의 처치시 다른 약물 복용의 가능성이 고려되어야 한다.

10. 기타

- 1) 이 약은 장용제피린 과립(pellet)으로 충전된 방출제어형 캡슐제로 위장관 pH가 5.5 이상인 곳에 도달하기 전까지 약물이 용출되지 않는다. 이 장용제피린 인하여 플루옥세틴의 흡수가 속방출형 제형에 비하여 1~2시간 지연된다.
- 2) 이 약을 주히 투여했을 때 플루옥세틴과 노르플루옥세틴의 혈중 peak농도와 trough 농도의 차이는 1일 1회 투여요법에 비하여 코다플루옥세틴: 24%(1일 1회), 164%(주1회), 노르플루옥세틴: 17%(1일 1회), 43%(주1회)). 혈장 농도가 반드시 임상반응과 일치하지는 않는다. 이 약의 주 1회 투여시 peak농도는 20mg 1일 투여시 평균 농도의 범위내이다. 평균 trough 농도는 20mg 1일 1회 투여시보다 플루옥세틴은 76%가 낮고, 노르플루옥세틴은 47% 낮다. 평균 정상상태 농도는 1일 1회 투여시와 주 1회 투여시 모두에서 투여된 총 용량에 비례하였다. 1일 1회 투여시와 비교하여 주 1회 요법으로 하였을 때, 평균 안정상태 농도는 약 50% 정도 낮아진다. 20mg 1일 1회 투여 후 다음날 주 1회 투여로 변경하였을 때 90mg 주 1회 투여시 혈중최고농도는 20mg 1일 1회 투여요법시의 혈중 최고농도에 비하여 거의 1.7배에 다다랐다. 반면에 일주일의 간격을 두고 변경하였을 때 혈중최고농도는 유사하였다. 평균 플루옥세틴 안정상태 농도도 다음날 주 1회 요법으로 변경하였을 때 혈중최고농도는 유사하였다. 평균 플루옥세틴 안정상태 농도도 다음날 주 1회 요법으로 변경하였을 때 증가하였다. 약역학적 관점에서 20mg 1일 1회 마지마루, 90mg 주 1회 최초 투여전까지 일주일의 간격을 두는 것이 바람직하다.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

〈표1〉 위대조임상시험에서 이상반응 발생률

신체 각 부위/ 이상반응	이상반응 이 약 (1730명)	발생률 위 약 (799명)	신체 각 부위/ 이상반응	이상반 이 약 (1730명)	발생률 위 약 (799명)
신경계			전신		
두통	20.3	15.5	무력증	4.4	1.9
신경과민	14.9	8.5	바이러스 감염	3.4	3.1
불면증	13.8	7.1	사지통증	1.6	1.1
출혈	11.6	6.3	발열	1.4	—
불안	9.4	5.5	홍통	1.3	1.1
진전	7.9	2.4	알레르기	1.2	1.1
어지러움	5.7	3.3	인플루엔자	1.2	1.5
피로	4.2	1.1			
진정	1.9	1.3	호흡기계		
감각이상	1.7	2.0	상기도 감염	7.6	6.0
성욕감퇴	1.6	—	간기유사증상	2.8	1.9
두드림	1.6	—	인두염	2.7	1.3
집중력 감소	1.5	—	비출혈	2.6	2.3
			투통(부비강)	2.3	1.8
소화기계			부비염	2.1	2.0
구역	21.1	10.1	기침	1.6	1.6
설사	12.3	7.0	호흡관관종	1.4	—
구갈	9.5	6.0			
식욕부진	8.7	1.5	심혈관계		
소화불량	6.4	4.3	홍조	1.8	1.0
변비	4.5	3.3	심계항진	1.3	1.4
복통	3.4	2.9			
구토	2.4	1.3	근골격계		
미각변화	1.8	—	배통	2.0	2.4
복부팽만감	1.6	1.1	관절통	1.2	1.1
위장장애	1.0	1.4	근육통	1.2	1.0
피부 및 부속기			비뇨생식기계		
과도한 발한	8.4	3.8	월경통	1.9	1.4
발적	2.7	1.8	성기능 이상	1.9	—
가려움	2.4	1.4	빈뇨	1.6	—
			요로계 감염	1.2	—
			감각기계		
			시각장애	2.8	1.8

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.



KGMP 적격업체

이남제약

본사·공장: 경북 경산시 진량읍 신상리 1204
서울: 서울특별시 동대문구 답십리동 488-338

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.