디스크 · 요통 · 골격근 이완제

KGMP	전문의약품
적 격 업 체	분류번호 : 122

카신정

카르바민산 클로르페네신

CASIN

허리와 등이 뻐근하고 근육이 결리며 당기고 욱씬욱씬 아프며 운동통, 압통이 있는 통증은 각종 육체적, 정신적 원인에 의한 근육의 과도한 긴장으로 인해서 야기됩니다. 이것은 두발로 직립하여 활동하는 인류에게는 척추에 부담이 크므로 생기는 필연적인 질환입니다.

일반 통계에 의하면 이런 통증을 경험한 사람이 70~80% 정도라 하며 특히 사회활동이 많은 현대인에게 신체적 고통을 많이 주므로 크게 주목되고 있습니다.

이러한 각종 근긴장성 동통 질환에는 척추에 대한 작용이 강하고 뇌에 대한 영향이 적은 카신정이 바람직한 약제로서 추천되고 있습니다.

카신정은 Mephenesin류 관련화합물의 연구에 의해서 개발된 Chlorphenesin Carbamate를 함유하는 골격근 이완제입니다.

카신정은 명확한 근이완 작용을 나타내는 용량을 투여하여도 진정 증상 등 상위중추억제작용은 나타내지 않습니다.

카신정은 다른 근이완제에서 볼 수 없었던 골격근 동통에 대하여 완화한 진통작용을 나타냅니다.

카신정은 복용 후 흡수가 신속하고 지속성도 우수하며 임상적으로는 각종 운동기 질환에 기인한 구간근의 과긴장 완해, 근통의 경감, 운동제한 등의 개선으로 치료 효과를 나타냅니다.

〔원료약품의 분량〕 1정중

카르바민산 클로르페네신(약전) 125mg

〔성　　상〕 백색의 원형 정제

〔작용 및 특장〕

1. 카신정은 디스크, 요통, 근경직 등의 동통을 수반하는 골격근 장해를 내과적으로 복용하여 치료하는 골격근 이완제입니다.
2. 카신정은 척추의 다시납스(Synapse) 반사경로에 대한 개재 뉴론(Neuron)을 선택적으로 차단하고 신경충격(impulse)의 전달을 억제 함으로서 골격근 경축을 완해합니다.
3. 카신정은 복용 후 흡수가 빠르고 근이완 효과는 Methocarbamol이 보다 강력하며 그 작용은 지속적입니다.
4. 카신정은 근이완 증상의 사용량에도 불구하고 뇌의 각성수준에는 영향을 미치지 않습니다.
5. 카신정은 광범위한 골격근 질환의 동통을 완화시키고 운동력을 회복시켜 줍니다.

〔효능 · 효과〕

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 변형성척추증, 추간판헤르니아, 척추분리 · 전위증, 척추골다공증, 경견완증후군

〔용법 · 용량〕

성인 : 카르바민산 클로르페네신으로서 1회 250mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

〔저장방법 · 사용기간〕 기밀용기, 3년

〔사용상의 주의사항〕

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 간장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 간장애의 병력이 있는 환자
   2) 신장애 환자
3. 부작용
   1) 과민증 : 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
   2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통, 두중감, 무력 · 권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
   3) 소화기계 : 때때로 구역 · 구기, 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있다.
   4) 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
   2) 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)를 하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용

   다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여한다.
   2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
7. 소아에 대한 투여

   유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 투여하지않는 것이 바람직하다.
8. 고령자에 대한 투여

   일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다..

* 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
제품에 관한 문의는 소비자상담실(TEL : 02-522-7005)로 문의 바랍니다.

설명서개정년월 : 2003년 12월

제조발매원
永一藥品工業株式會社
충북 진천군 진천읍 신정리 521-15