체중감소를 위한 식욕억제제

엔슬림정

Enslim Tab.

향정신성의약품
별표 : 6, 46

자율신경계용약
분류번호 : 123

최근 우리 사회에서는 소득수준의 향상, 식생활 습관의 빠른 서구화 경향으로 비만이 급속도로 확산되고 있습니다. 비만은 지방세포의 비대나 수적인 증가에 의해 체내에 지방이 과다하게 축적된 상태를 말하며, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증등의 각종 성인병을 유발하는 위험요인으로 알려져 있습니다. 이러한 비만을 치료하기 위해서는 식이요법과 지속적인 운동요법을 병행하여야 치료효과가 증진됩니다. 그러나 비만증 환자는 식욕이 왕성하여 평소의 식사습관을 바꾸는 것이 어려워 비만증을 치료하는데 어려움을 겪고 있습니다. 엔슬림정은 식욕중추에 작용하여 식욕을 억제시켜 효과적인 체중감량을 유도할 수 있게 해줍니다.

성 상

흰색의 원형 정제

원료약품 및 그분량

1정 중

주석산펜디메트라진(USP) ····· 35mg

효 능 및 효 과

칼로리제한 식이요법과 병행하여 체중감소를 위한 식욕억제

용 법 및 용 량

성인 1일 3회, 1회 1정 복용

사용상의 주의사항

1. 경고
   1) 식욕억제 효과의 내성은 통상적으로 수주일 이내 나타나고, 식욕억제 효과에 대한 내성이 나타났을 경우에는 용량을 증가시키지 말고, 이 약의 사용을 중지할 것.
   2) Monoamine oxidase 저해제의 투여 후 14일 이내 펜디메트라진의 사용은 혈압상승 위험을 초래할 수 있습니다.
   3) 오랫동안 고용량 투약 후 갑작스런 투약 중지는 극도한 피로나 우울증을 초래할 수 있다.
   4) 중추신경계에 작용하는 이 약의 효과 때문에 기계운전이나 자동차 운전등의 위험한 활동에 종사하고 있는 사람들은 주의하여 투여하여야 한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 진전된 동맥경화증 환자

⬇ 뒷면계속

ISO 9001 | K G M P

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 · 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
· 인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr · 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

2) 증후성 심혈관계 질환 환자
3) 심한 고혈압 환자
4) 갑상선 기능 항진 환자
5) 이 약에 과민증인 환자
6) 교감신경 흥분성 아민류에 특이체질인 환자
7) 녹내장 환자
8) 정신장애 상태(불안, 흥분)환자
9) 약물남용의 병력이 있는 환자
10) 임산부 및 임신 가능성이 있는 부인
11) 12세 이하의 소아

3. 부작용
1) 심혈관계 : 심계항진, 빈맥, 혈압상승
2) 중추신경계 : 과자극작용, 불안감, 현기증, 불면증, 도취감, 두통, 드물게 복용량에서 정신장애가 나타날 수 있습니다.
3) 소화기계 : 구갈, 불쾌감, 설사, 변비, 기타 위장관 장애
4) 내분비계 : 발기부전, 성적충동의 변화
5) 과민증 : 담마진

4. 일반적주의
1) 식욕억제 효과에 의한 내성이 나타났을 경우에는 이 약 사용을 중지할 것
2) 기계운전이나 자동차운전 등의 위험한 활동에 종사하고 있는 사람에는 주의하여 투여할 것
3) 인슐린 의존성 진성 당뇨병 환자에게 식이요법과 병행하여 이 약을 투여할 경우 인슐린 투여량을 조절하여야 한다.

5. 상호작용
1) 이 약의 투여로 구아네티딘의 혈압강하 효과를 저하시킬 수 있다.
2) 뇨의 산성화는 이 약의 배설을 증가시킨다.

6. 과량투여시의 처치
1) 급속한 과량투여의 증상은 과도한 흥분, 진전, 반사항진, 호흡촉진, 혼란, 환각, 공격성, 공황상태가 나타날 수 있으며, 독성은 경련, 뇌사 및 사망을 초래할 수 있다.
2) 심혈관계 빈맥, 고혈압 또는 저혈압 및 심장 발작
3) 소화기계 구갈, 불쾌감, 설사, 변비, 기타 위장관 장애
4) 이 약의 신속한 해독은 바비츄레이트류의 진정제 투여와 위세척을 포함한 대증요법이며, 뇨의 산성화는 이 약의 배설을 증가시킨다.
5) 이 약의 과량 투여로 인한 급격한 혈압상승에는 가능한 신속히 펜톨라민의 정맥주사가 추천된다.

7. 기타
1) 의존성 : 이 약은 암페타민류와 화학적 및 약리학적으로 연관되어 있다. 암페타민류 및 관련 흥분성 약물들은 거의 남용성을 가지며, 이 약의 남용 가능성은 몸무게 감소 프로그램처럼 의존성 약물이 포함될 때 유의해야 한다.
2) 암페타민류 및 관련 약물들은 강한 정신적 의존성 및 사회적 문제와 관련될 수 있다

포 장 단 위

300정

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질,변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
* 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

문안작성일: 2003. 6. (Rev. 0)