

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐중

트리플루살(이.피) 300mg

【성 상】 흰색 또는 거의 흰색가루가 든 상하부 무색투명의 경질캡슐제

【효능·효과】

혈전증에 의한 합병증을 포함한 혈전색전질환 예방과 치료 및 혈소판 응집억제
주작용증

- 일과성 허혈에 의한 뇌혈관장애 또는 가역적 불완전 신경결핍을 나타내는 뇌혈관장애의 예방 및 증상개선
- 불안정 협심증으로 인한 급성 심근경색의 예방
- 동맥경화성 기능장애의 예방
- 외과수술 후 심부정맥 혈전증 및 폐색전증의 예방
- 혈관수술 후 혈전증

【용법·용량】

성인 1일 트리플루살로서 3000-900mg을 식사중 또는 식후에 분할 투여한다.
단, 연령 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 임신부
 - 2) 소화성 궤양의 기왕력이 있는 환자
 - 3) 살리실산 유도체에 과민성이 있는 환자
2. 이상반응
과민한 환자에서 위통, 연하곤란, 속쓰림, 소화불량, 구역 등의 위부불쾌감이 나타날 수 있으나 식사와 함께 복용하거나 제산제를 투여하면 증상이 경감됩니다. 드물게 소화성 출혈, 멜레나, 결막출혈, 반상출혈, 청각장애, 편두통이 나타날 수 있다.
3. 상호작용
 - 1) 항응고제요법을 받고 있는 환자에게 이 약을 투여하면 항응고제의 효력을 증가시킬 수 있으므로 주의하여 투여해야 한다.
 - 2) 이 약은 경구용 혈당강하제의 작용을 증가시킬 수 있으므로 병용투여시에는 혈당강하제의 용량을 감량해야 한다.
4. 임부에 대한 투여
이 약의 기형발생에 대한 영향의 증거는 없지만 임신 또는 임신가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
5. 과량투여시의 처치
 - 1) 과량복용시에만 나타나는 우발적인 중독사고의 경우, 중추신경계의 흥분 또는 억제증상, 심장 순환기계 및 호흡기계의 변화, 소화성 출혈 및 설사 등과 함께 전해질 평형의 변화가 나타날 수 있다.
 - 2) 중독이 일어난 경우 활성탄 수성현탁액을 투여하거나 위세척을 실시하고 전해질 평형을 유지하며 대증요법을 실시한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣은 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법 및 유효기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, • 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

첨부문서 작성일: 2006. 10



한국웰니스제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담실: 031)494-5995

*본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

*이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.