# 엘도코프 캡슐

전문의약품

급·만성 호흡기질환 치료제
에르도스테인 제제

**작 용 · 특 성 :** **엘도코프 캡슐**은 담중의 thiol 결합을 **분해하여** 담을 묽게하고, 섬모 운동을 촉진시킴으로써 객담의 배출을 **쉽게** 하여 신속하고 우수한 거담 효과를 나타내는 급·만성 호흡기질환 치료제입니다.

**엘도코프 캡슐**은 기관지와 폐포의 파괴를 막아주며, 호흡기 면역물질인 IgA의 양을 증가시키고, 인체내 생리적 항균물질인 lysozyme, lactoferrin의 양을 증가시켜 근본적으로 호흡기를 강화시켜 줍니다. 이에 따라 만성기관지염의 재발을 감소시키며, 악화를 예방하는 효과를 발휘합니다.

**엘도코프 캡슐**은 pro-drug으로서 거담제의 공통적인 부작용인 위장장애가 없으며, 항생제와 병용시 담중의 항생제 농도를 높여줌으로써 상승작용을 발휘해 치료기간을 단축시켜 줍니다.

**조 성 · 성 상 :** **1. 원료약품의 분량 :** 매 캡슐당

에르도스테인 (별규) ····· 300mg

**2. 성상 :** 백색의 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 황색의 경질캡슐제

**효 능 · 효 과 :** 급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

**용 법 · 용 량 :** 1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

**사 용 상 의 주 의 사 항 :**

**1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

1) 동성분에 과민증이 있는 환자

2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소 (cystathionine synthase) 결핍환자

**2. 이상반응**

1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났습니다.

2) 국내 시판후 조사결과(조사 증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며 , 이 약과의 관련 여부는 확실치 않습니다.

: 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

**3. 상호작용**

항생제, 기관지 확장제(테오필린, $\beta_2$-효능약, 기침완화제 (cough sedative) 등)와 병용할 수 있습니다.

**4. 임부 · 수유부에 대한 투여**

임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

**5. 보관 및 취급상의 주의사항**

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

**저 장 방 법 :** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

**포 장 단 위 :** **엘도코프 캡슐** ····· 10, 100캡슐

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

**약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.**

**KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품**

I01 · 121404


종근당 의 계열회사

경보약품

본사 · 공장 : 충청남도 아산시 실옥동 345-6
서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
소비자상담실 : 02-365-2312