

HEALTHFUL LIFE BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

여드름 치료제

아크닌[®] 액

(인산클린다마이신)

ACNIN Sol.

분류번호: 619



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들어 있습니다

[성분 · 함량] 100mL 중

인산클린다마이신 (항기) 1,188mg

(클린다마이신으로서 1,000mg)

[성상]

알콜성 냄새가 있는 무색의 국소용 액제

[효능 · 효과]

- 유효균종 : 프로피오니박테륨 아크네
- 적응증 : 심상성여드름(보통여드름)

[용법 · 용량]

- 성인 : 1일 2회 환부에 얇게 바르십시오. 약을 바르기 전에 환부를 깨끗이 씻으십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 클린다마이신이나 린코마이신에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 국한성회장염 또는 궤양성대장염의 병력이 있는 환자
 - 항생물질 관련 대장염의 병력이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 12세 이하의 소아
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 마십시오.
과산화벤조일을 함유한 제제를 이 약과 동시에 사용하지 않습니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 아토피성 체질 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 피부 : 피부건조감, 접촉성피부염, 피부자극(황반, 탈피, 화끈감, 가려움, 건조감, 홍반 등), 피부유성감(지성피부화)이 나타날 수 있습니다.
 - 소화기계 : 복통, 위장장애가 일어날 수 있습니다. 또한 클린다마이신을 국소 및 전신적으로 사용하여 설사, 유혈성 설사 및 위막성대장염을 포함하는 대장염이 보고된 바 있습니다. 이러한 증상은 클린다마이신 사용 후 수일, 수주 또는 수개월 후에 나타날 수 있고 클린다마이신 사용 중단 후 3~4주 기간 중에 발현될 수도 있습니다. 치료 도중에 중증인 설사가 나타나면 사용을 중지하고 대장의 내시경 검사를 고려하십시오.
 - 기타 : 그람음성 모낭염, 과민반응, 안구자통이 보고되어 있습니다.
- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
 - 경구 및 정맥으로 투여된 클린다마이신은 중증의 대장염과 관련이 있고 환자가 사망할 수도 있습니다. 클린다마이신의 국소제제 사용 시 피부표면으로부터 항생물질이 흡수됩니다. 설사, 혈액변, 대장염(위막성대장염 포함)이 클린다마이신 국소제제와 전신제제 사용 시에 보고된 바 있습니다. 클로스트리듐 다이피셀에 의해 생산된 독소가 항생물질 관련 대장염의 주된 원인으로 보고되었습니다. 대장염은 대개 중증의 지속성설사와 중증의 복부경련이 특징이며 혈액과 점액의 통로와 관련 있는 것 같습니다.

위막성대장염은 내시경검사로 판별할 수 있습니다. 클로스트리듐 다이피셀에 대한 대변 배양과 클로스트리듐 다이피셀 독소의 대변검사가 진단에 도움이 됩니다. 투여 도중에 설사가 중증인 경우에는 투여를 즉시 중지합니다. 중증설사의 경우 확정적 진단을 위해 대장의 내시경검사가 권장됩니다.

- 3) 설사, 대장염, 위막성대장염은 클린다마이신의 경구 및 정맥투여 중지 후 수 주일 후에도 나타나는 것이 관찰된 바 있습니다.
 - 4) 대장염이 경증인 경우에는 투여를 중지함으로써 회복되나 중등도 내지 중증인 경우에는 즉시 수액, 전해질 및 단백질 보충 등 적절한 처치를 합니다. 아편이나 아트로핀을 함유하는 디페녹시레이트와 같은 역연동제는 증상을 장기화 시키거나 또는 악화시킬 수 있습니다.
 - 5) 반코마이신이 클로스트리듐에 의해 야기된 항생물질 관련 위막성대장염의 치료에 효과적인 것으로 밝혀졌습니다. 보통 성인의 경우 1일 반코마이신 500mg~2g을 3~4회 분할하여 7~10일 동안 경구투여 합니다.
 - 6) 시험관내 실험에서 콜레스티라민 수지와 콜레스티폴 수지가 독소와 결합하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 수지와 반코마이신을 병용 투여할 경우에는 적어도 2시간 간격을 두고 투여합니다.
 - 7) 코르티코이드의 지속관장 및 전신투여가 대장염의 증세완화에 효과가 있습니다. 대장염을 일으킨 다른 원인도 찾아보아야 하며, 이 약 및 기타 알레르기성 항원에 과민반응의 병력의 여부에 대하여 세심한 주의를 기울입니다.
 - 8) 알코올성 기제를 함유하고 있을 경우에 눈에 묻으면 안구작열감과 안자극을 일으킬 수 있으므로 실수로 눈이나 벗겨진 피부 또는 점막에 묻었을 경우에는 냉수로 충분히 씻으십시오.
 - 9) 이 약은 맛이 좋지 않으므로 입주위에 바를 경우에는 주의하십시오.
 - 10) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
6. 임부 및 수유부에 대한 사용
- 1) 랫트와 마우스를 대상으로 한 생식시험에서[피하 및 경구용량 : 1일 체중 Kg당 100~600mg(역가)] 클린다마이신으로 인한 수태율 손상이나 태아에 대한 해가 없습니다.
그러나 임부를 대상으로 적절히 시행된 임상자료가 없고 동물생식시험 결과로 인체 내 반응을 언제나 예견할 수 있는 것은 아니므로 임신기간 중에 사용하지 마십시오.
 - 2) 이 약 사용 후 클린다마이신이 모유로 분비되는지의 여부는 밝혀진 바 없으나 경구 및 비경구적으로 투여된 클린다마이신이 모유를 통해 분비된다는 보고가 있습니다. 일반적으로 많은 약물들이 모유를 통해 분비되므로 이 약 사용 중에는 수유하지 마십시오.
7. 소아에 대한 사용
- 12세 미만의 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않습니다.
8. 과량투여 시 처치
- 이 약을 국소적으로 적용 시 전신효과를 나타낼 정도로 충분한 양이 흡수될 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 용기마개를 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.co.kr)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부((02)2025-0247) 또는 개발부((02)2025-0213~5)로 문의바랍니다.

작성일자 : 2005. 01. 22
MK0802181

(주)메디카 코리아

경기도 화성시 향남읍 상신리 904-6