

골관절염치료제 아세렌 캡슐

(디아세레인 50mg)

분류번호: 399

전문의약품

Aceren Cap.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(377mg)중
디아세레인(식약청고시).....50mg
· 유당 <기원 : 소, 사용 : 우유>

【성 상】
황갈색의 가루가 들어있는 상부-주황색, 하부-담황색의
경질캡슐

【효능 · 효과】
골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

【용법 · 용량】
성인 : 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할
하여 식후 경구투여 한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 염증성 대장 질환 환자(궤양성 대장염, 크론병)
 - 장폐색 증후군 환자
 - 원일불명의 복통환자
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논
배당체) 약물에 과민반응 환자
 - 중증의 간부전 환자
 - 15세 미만의 소아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라
퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여한다.)
 - 임부 및 수유부
 - 고령자(용량 감소가 필요하다.)
- 이상반응
 - 소화기계 : 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애
(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이
나타날 수 있다.
 - 피부 : 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의

- 장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.
- 상호작용
 - 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유한 제산제 및 소금은
이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간
이상의 간격을 두고 투여한다.
 - 이뇨제와 병용투여시 이뇨작용이 약하게 증강될 수 있다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었다.
 - 이 약이 인체내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는
없으나, 모유 중으로 안트라퀴논 유도체가 소량 이행
되므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이
바람직하다.
 - 과량투여시의 처치
 - 증상 : 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있다.
 - 처치 : 필요시 전해질 공급 등의 대증용법을 실시한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30캡슐, 100캡슐, 500캡슐

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”
에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약
구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패
또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을
통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2007년 06월
08일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부
(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2007년 06월 08일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장: 강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품