300캡슐

고콜레스테롤 혈증 개선제

콜다운 연질캡슐

Chol-Down Soft Cap.

제조 • 판매원

대한뉴팜(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 904-3

일반의약품

분류번호 : 218

[성분 • 함량] 1캡슐 중

판테친(약전) ..... 62.5mg(판테친으로서 50mg)

콩기름불검화물(식약청고시) 100mg

(천연토코페롤로서 18.0mg, 식물성스테롤로서 40.0mg)

비타민E(U.S.P.) ..... 22.67 IU (초산 d-α - 토코페롤로서16.67mg)

[성 상]

미황갈색의 내용물이 충진된 연두색 타원형 연질캡슐

[효능 • 효과]

고콜레스테롤 혈증의 개선

고콜레스테롤 혈증에 관계되는 말초혈행장애(수족냉증 • 저림)의 완화

[용법 • 용량]

성인 1회 2캡슐 1일 3회, 식후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 경우의 사람은 사용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 복용 시 다음 사항을 주의하십시오.
   (1) 정해진 용법 및 용량을 지키십시오.
   (2) 고콜레스테롤혈증의 개선에는 식이요법이 중요하므로 본 제품을 복용하더라도 식이요법을 병행하십시오.
3. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항에 주의하십시오.
   (1) 이 약 복용에 의해 가려움, 발진, 발적, 식욕부진, 하리(설사), 연변, 복통, 위부불쾌감, 구역, 가슴앓이, 오심 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   (2) 이 약 복용에 의해 생리가 예전보다 빨라지거나 양이 많아질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
   (3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선(고콜레스테롤 수치의 저하)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 저장상의 주의사항
   (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   (2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   (3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

KOSDAQ 코스닥등록법인

정부승인 KGMP 우수의약품지정업체

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 이 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 02-3415-7837)

8 809010 773193

제조번호 :

사용기한 :

고콜레스테롤 혈증 개선제

콜다운 연질캡슐

(판테친)

일반의약품

Chol-Down Soft Cap.

분류번호 : 218

■ **성분 · 함량** : 1캡슐중

판테친(KP) ····· 62.5 mg
(판테친으로서 50 mg)
콩기름불검화물(KPC) ····· 100.0 mg
비타민E(USP) ····· 22.67 I.U
(초산 d-α-토코페롤로서 16.67mg)

■ **성 상**

미황갈색의 내용물이 충진된 연두색 타원형 연질캡슐

■ **효능 · 효과**

고콜레스테롤 혈증의 개선
고콜레스테롤 혈증에 관계되는 말초혈행장애(수족냉증 · 저림)의 완화

■ **용법 · 용량**

성인 1회 2캡슐 1일 3회, 식후에 복용합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 경우의 사람은 사용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 복용 시 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 정해진 용법 및 용량을 잘 지킵니다.
   2) 고콜레스테롤혈증의 개선에는 식이요법이 중요하므로 본 제품을 복용하더라도 식이요법을 병행합니다.
3. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 이 약 복용에 의해 가려움, 발진, 발적, 식욕부진, 하리(설사), 연변, 복통, 위부불쾌감, 구역, 가슴앓이, 오심 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
   2) 이 약 복용에 의해 생리가 예전보다 빨라지거나 양이 많아질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담합니다.
   3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선(고콜레스테롤 수치의 저하)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
4. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
   3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ **저장방법**

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위**

100, 300, 500 캡슐

※ 이 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바랍니다.
(전화 : 02-3415-7857)

작성년월일 : 2007. 01. 19

제조 · 판매원
대한뉴팜(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-3

30153698-01