

기타의 호흡기관용약

아세라제 캡슐

Acebrophylline 100mg

300캡슐



Huons

전문약품/분류번호 : 229

■ 원료약품의 분량 1캡슐 중 아세브로필린(아세필린산 암복소염)(별규) 100mg

■ 성상 백색-미백색 분말이 든 상부는 연회색, 하부는 백색의 경질 캡슐

■ 효능·효과 기도폐쇄성 장애 및 점액분비장애로 인한 급, 만성 호흡기 질환: 급, 만성기관지염, 기관지 천식, 부비강염, 건성비염

■ 용법·용량 성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 사용하지 않 것.
크산틴계 약물에 과민증 환자
2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.
 - 1) 중증 신장애 환자
 - 2) 심장에 및 관상순환 부전 환자
 - 3) 비만환자
 - 4) 간질의 병력이 있는 환자
 - 5) 위, 십이지장궤양 환자
 - 6) 갑상선기능항진증 환자
3. 부작용
 - 1) 크산틴 유도체를 사용할 경우, 일시적 오심 및 헛기름이 보고된 사례가 있음. 약물투여를 중단할 경우 이러한 작용은 없어진다.
 - 2) 소화기계: 드물게 위부불쾌감, 위, 복부팽만감, 위, 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴 쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민증: 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반하는 제은

- 상승 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 호흡기계: 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
 - 5) 기타: 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
- 상호작용
- 1) 에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 올레안도마이신, 린코마이신, 시메티딘, 알로푸리놀, 퀴놀론계 약물과 병용투여시 이 약의 혈중농도를 증가시킬 수 있다.
 - 2) Furosemide와의 병용투여시 이뇨작용이 증대될 수 있고, Reserpine과의 병용투여시 빈맥을 유발할 수 있다.
 - 3) 바르비탈계 약물, 페니토인과 병용투여시 또는 흡연 환자에게 이 약을 투여시 이 약의 혈중농도를 감소시킬 수 있다.
 - 4) 다른 크산틴계 약물 또는 중추신경흥분제와 병용하면 과도의 중추신경자극작용이 나타남으로 이러한 약과 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.
 5. 임부 및 수유부에 대한 투여
최기성이 보고되지 않았으나, 전석치료를 하지 않아 산모에게 치명적일 수 있을 경우를 제외하고 임신 첫달 및 임신말기에 사용하지 말 것. 태아발육에 대한 부작용은 보고된 바 없으나, 다른 약물과 마찬가지로 이 약을 임신기간에는 추천하지 않는다. 수유기중 효과는 확립되어 있지 않으므로 수유모는 이 약을 복용하지 않도록 주의한다.
 6. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

7. 소아에 대한 투여
소아에 이 약을 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
8. 과량 투여시의 처치
과용량 투여 사례는 보고된 바 없다. 그러나, 과용량을 투여하여 전신경련이 일어나지 않았을 경우, 완하제 및 활성탄을 투여하여 구토를 유발한다. 전신경련이 일어났을 경우, 산소를 공급하여 호흡효율을 측정하고, 디아제팜을 정맥투여하고 물을 공급한 후 혈압을 측정한다.

■ 저장방법
기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 약약품은 임계한 유효기간을 위한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 우점 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

주식회사 휴온스 작성일 : 2006.04.21
경기도 화성시 향남면 상신리 907-6
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

8809032126144



분리배출

제조번호 :
사용기한 :