

HEALTHFUL LIFE + BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

기관지천식치료제

밤 비 정
(염산밤부테롤)

BAMBI Tab.

분류번호 : 229



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

[성분 · 함량] 1정 중

염산밤부테롤(EP) 10mg

[성상]

흰색의 장방형 정제

[효능 · 효과]

기관지 천식, 기관지 경련을 수반하는 만성기관지염, 폐기종 및 기타 폐관련질환

[용법 · 용량]

보통 성인 1일 1회 1정(10mg)을 취침시 경구투여합니다.

1~2주후에 2정(20mg)으로 증량할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 중증의 순환기질환
- 2) 갑상선 기능항진증
- 3) 저칼륨혈증
- 4) 중증의 간기능장애
- 5) 중증의 신기능장애

2. 이상반응

가장 빈번하게 나타나는 이상반응은 두통, 진전, 심계항진입니다. 대조연구에서 고용량인 20밀리그램을 유지요법으로 투여한 실험군 중 약 40%의 환자에서 치료초기에 진전증상이 보고되었습니다.

이상반응은 용량 의존적이고 일시적인 것입니다.

- 1) 순환기 : 가끔 심계항진이 나타나는 수가 있습니다.
- 2) 정신신경계 : 가끔 두통, 불안이 나타나는 수가 있습니다.
- 3) 피부 : 가끔 두드러기, 발진이 나타나는 수가 있습니다.
- 4) 근골격 : 가끔 진전, 손발경련이 나타나는 수가 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 테르부탈린의 주 대사경로가 신장이므로 중증의 신기능장애환자의 경우 초기용량을 감소하여야 합니다.
- 2) 간경화 또는 중증의 간기능장애를 유발할 요인이 있는 환자의 경우 밤부테롤을 테르부탈린으로 대사하지 못할 가능성이 있으므로 테르부탈린제제를 투여하는 것이 바람직합니다.

4. 상호작용

- 1) 밤부테롤은 suxameton(succinylcholine)의 근이완효과를 연장시킬 수 있습니다. 이는 밤부테롤이 suxameton을 불활성화시키는 혈장 cholinesterase를 용량 의존적, 가역적으로 억제하기 때문입니다.
- 2) β -차단제, 특히 비선택적 β -차단제는 β -자극제의 효과를 부분적 또는 완전히 억제할 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부의 투여

- 1) 밤부테롤을 동물에게 투여시 최기형성이 발견되지는 않았으나 임신 3개월 이내에는 신중히 사용하여야 합니다.
- 2) 밤부테롤이나 중간 대사물질이 모유를 통과하는지 여부는 알려져 있지 않습니다. 테르부탈린은 모유를 통과하나 치료용량에서 태자에게 아무런 영향도 미치지 않습니다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**[포장단위]** 자사포장단위

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.co.kr)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부 ((02)2025-0247) 또는 개발부 ((02)2025-0213~5)로 문의바랍니다.

개정일자 : 2005. 2.23
MK0708312

(주)메디카 코리아

경기도 화성시 향남읍 상신리 904-6