

아디레센 캡슐

(디아세레인)

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

디아세레인 (식약청고시 제98-127호) 50mg

【성 상】

황갈색의 내용물이 들어있는 상부-황색, 하부-연황색의 경질캡슐

【효능 · 효과】

골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)의 치료

【용법 · 용량】

증세에 따라 1캡슐 또는 2캡슐(디아세레인으로서는 50mg 또는 100mg)을
1일 1~2회 분할하여 식후 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민한 환자
2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
이 약은 안트라퀴논류이므로, 소장, 결장 장애 병력이 있는 환자에게는 투여
하지 말거나 혹은 신중히 투여해야 한다.
3. 부작용
약한 완하작용이 나타날 수 있다. (특히 안트라퀴논 유도체에 민감한 환자)
4. 일반적 주의
 - 1) 동물실험에서 최기형성 작용은 관찰되지 않았으나 임신, 수유기에는
투여하지 않는 것이 좋다.
 - 2) 장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.
 - 3) 노인에게 투여시 주의해서 용량 감소가 가능하다.
 - 4) 소아에게는 충분한 연구가 없었으므로 투여하지 말 것.
5. 적용상의 주의
 - 1) 과용량 투여시 약한 완하작용이 나타날 수 있다.
 - 2) 약물복용중 뇨가 노랗게 변색될 수 있다.
 - 3) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

【포장단위】 자사 포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한
이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여
교환하여 드립니다.

작성년월일 2005. 6. 2

제조발매원

이연제약주식회사

본사: 서울 · 용산구 동빙고동 38-6

공장: 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

TEL. (02)793-5557, 5374