

콘베린 연질캡슐

Converine Soft Cap.

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

주성분 : 구연산알베린(별규)..... 60mg

주성분 : 시메치린(USP)..... 300mg

첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호, 황색 5호

【성상】

흰색의 점조액이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

위장관계 경련의 진경, 장내 가스제거, 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

【용법·용량】 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 저혈압 환자
- 3) 무력성 장폐색증 환자

2. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.

- 1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지 반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
- 3) 기 타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
- 4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.

3. 일반적 주의

- 1) 도평테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다.
- 2) 정해진 용법·용량을 지켜야 한다.
- 3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.
- 4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임 부
동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여 하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 수유부
검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 어린이에 대한 투여

12세 미만의 어린이에는 권장되지 않는다.

6. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 (주)동구제약/경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

【제조·의뢰자】 이연제약(주)/충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 ezdrug.kfda.go.kr에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※ 고객센터설 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2009. 1. 2

理研 이연제약주식회사

본사:서울·용산구 동빙고동 38-6
공장:충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557, 5374