



전 문 의 약 품
Z39 : 기타의 소화기관용약

효과 빠른 위장관 진경 · 진통제

알메론 연질 캡슐

알메론연질캡슐은 구연산알베린과 시메치론의 상호작용으로 위장관의 경련을 진정시키고 장내 가스를 제거하여 복부팽만에 의한 통증을 감소시켜주는 소화기관용제입니다.

【성분 · 함량】 1캡슐 중

구연산알베린(별규).....	60.0mg
시메치론(USP).....	300.0mg

【성상】 흰색의 점조성 내용물이 든 암록색의 타원형 연질캡슐제

【효능 · 효과】 위장관계 경련의 진경, 장내가스 제거, 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

【용법 · 용량】 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
 - 저혈압환자
 - 무력성 장폐색증 환자
- 이상반응
 - 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있습니다.
 - 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있습니다.
 - 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.
 - 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있습니다.
 - 국내에서 6년 동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었습니다.
- 일반적 주의
 - 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있습니다.
 - 정해진 용법 · 용량을 지켜야 합니다.
 - 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알립니다.
 - 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알립니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부
동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
 - 수유부
검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 어린이에 대한 투여
 - 12세 미만의 어린이에는 권장되지 않습니다.
- 과량투여시의 처리
 - 과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있습니다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행합니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 100, 500캡슐

- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사, 약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 본사는 고객센터(전용전화(080-200-0101))를 운영하고 있습니다.
- ※ 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 최신의 의약품안전성 정보는 신풍제약(주) 홈페이지(www.shinpoong.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

3-335(S)
설명서 작성년월일 20061117



민족의 숨겨진 공지로 인류의 건강을 위하여

신풍제약주식회사

경기도 안산시 단원구 독내동 434-4 · TEL 031-491-6191-2