

진코발 주

분류번호 : 219

■ 원료약품의 분량 1mL 중

은행엽엑스(KPC) 3.5mg

(총 키크고플라본 배당체로서 0.84mg에 해당)

■ 성 상

얇은 갈색의 액이 들어있는 갈색의 유리 앰플

■ 효능 · 효과

- 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애 : 지적 및 경각능력저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력 감퇴, 불안, 우울감, 내이성 난청, 혈관성·대사성·경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하
- 동맥경화성 혈관증, 고지 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색질환 또는 간헐성파행증) 폐색성 혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애 등과 같은 말초동맥순환장애

■ 용법 · 용량

1일 5~10mL를 근육주사 또는 정맥주사 하거나 2일마다 15mL를 정맥주사한다.

- 급성치료시 : 1일 25mL를 정맥주사 또는 점적정주한다.
- 중증치료시 : 1일 25-50mL를 정맥주사 또는 점적정주한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2. 경고
앰플주사제 용기 절단 시 유리파편이 혼입되어 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
3. 이상반응
 - 1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알러지가 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알러지성 피부증상이 일어날 수 있다.
 - 2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 속 등이 관찰 된다.
 - 3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사증상이 나타날 수 있다.
4. 기타
이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1-30℃)보관

작성일 : 2006.03.21