

비타모 주 (덱스판테놀)

분류번호 : 239

■ 원료약품의 분량 1mL 중

덱스판테놀(U.S.P.)250mg

■ 성 상

흰색~미황색의 용액이 들어있는 갈색의 앰플

■ 효능·효과

1. 주효능 효과

- 1) 판토텐산결핍증의 예방 및 치료
- 2) 판토텐산의 수요가 증대하고 식사로부터 섭취가 불충분한 때의 보급 (소모성 질환, 갑상선기능 항진증, 임부, 수유부 등)
- 3) 다음 질환 중 판토텐산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우 : 스트렙토마이신 및 카나마이신에 따른 부작용의 예방 및 치료, 접촉피부염, 급 만성습진, 수술 후 장관 마비

■ 용법·용량

성인 : 덱스판테놀로서 1회 20~100mg 1일 1~2회 근육 또는 정맥주사한다.
수술후 장관 마비에는 1회 50~500mg 1일 1~3회 투여하고 필요시 6회까지 증가할 수 있다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

주사액의 조제 : 정맥주사시는 이 약 500mg을 포도당주사액 또는 유산염 링겔용액 등의 정맥주사 용액과 혼합하여 천천히 정맥내 주입한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이 노약자 사용시에는 투여하지 말 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

혈우병 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

고혈압증후가 나타나면 투여를 중지한다.

4. 부작용

- 1) 피부 : 가려움증, 타진통, 호흡곤란, 피부의 붉은 반점, 전신적 피부염, 두드러기가 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 드물게 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 3) 호흡기계 : 석사메토늄(succinylcholine) 투여의 중단 5분후 이 약 투여시 호흡곤란이 나타날 수 있다.
- 4) 순환기계 : 가벼운 혈압저하가 나타날 수 있으며 노인에게서 약간의 흥분이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약은 직접 정맥내로 단독 투여할 수 없다.
(용법·용량항을 참조할 것)
- 2) 부교감신경흥분제(네오스티그민 등) 사용후에는 12시간, 또한 석사메토늄(succinylcholine) 투여 후에는 1시간의 간격을 두고 이 약을 투여하는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

1) 드물게 항생물질, 마취제, 바르비탈계 약물과 병용투여시 원인불명의 알레르기반응이 보고되어 있다.

2) 이 약 투여로 여성에게 있어서 석사메토늄(succinylcholine)의 효과를 연장시키는 것으로 나타났다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

9. 기타

저칼륨혈증, 기계적 장폐색증 환자에는 임상효과를 얻을 수 없다.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

작성일 : 2007.05.03

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 www.huans.com에서 확인하실 수 있습니다.