

위·장기능 정상화제

유니콘 연질캡슐

전문의약품
분류번호 239



UNIMED

유니콘연질캡슐은 장관의 구심성 신경의 민감도를 낮추어 줌으로써 진경 효과를 나타내며 알베린과 시메치콘의 상승효과로 복부팽만으로 인한 소화기계 통증을 경감시킬 뿐만 아니라 고창 및 기능성 대장 질환에도 뛰어난 효과를 나타냅니다.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중
구연산알베린(별규).....60mg
시메치콘(U.S.P.).....300mg

■ 성상 : 흰색의 점조액이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

■ 효능·효과 :
- 위장관계 경련의 진경
- 장내 가스제거
- 복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

■ 용법·용량 : 1회 1캡슐, 1일 2-3회 식전에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항 :

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 저혈압 환자
 - 3) 무력성 장폐색증 환자
2. 이상반응
이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.
 - 1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
 - 3) 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
 - 4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.

3. 일반적 주의

- 1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다.
- 2) 정해진 용법·용량을 지켜야 한다.
- 3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.
- 4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부
동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 수유부
검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 어린이에 대한 투여

12세 미만의 어린이에는 권장되지 않는다.

6. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량 투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10, 90캡슐

※ 본 제품의 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

● 서울시 송파구 잠실본동 250-8 유니메드빌딩 / (02)2240-5100

UM010906

● 공장 : 충남 아산시 실목동 251 번지

● 홈페이지 : <http://www.unimed.co.kr>

제조사
UNIMED
참제약주식회사