

알시젠 연질캡슐

Alsigen Soft capsule

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

구연산알베린(별규) 60mg

시메치콘(유.에스.피) 300mg

【성 상】 백색의 점조성 내용물이 충전된 암록색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

-위장관계 경련의 진경

-장내 가스제거

-복부팽만으로 인한 소화기계 통증의 경감

【용법·용량】 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자

2) 저혈압 환자

3) 무력성 장폐색증 환자

2. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있습니다.

1) 과민반응: 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있습니다.

2) 소화기계: 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.

3) 기 타: 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있습니다.

4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고 되었습니다.

3. 일반적 주의

1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있습니다.

2) 정해진 용법·용량을 지켜야 합니다.

3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알려십시오.

4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알려십시오.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

2) 수유부

검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

5. 어린이에 대한 투여

12세 미만의 어린이에는 권장되지 않습니다.

6. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있습니다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행하십시오.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

【포 장 단 위】 자사포장단위

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃).

※본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바라며, 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되오니 참고하시기 바랍니다. Tel : 02-876-7777(대)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



생명공학 제약기업

(주) 뉴젠팜

본사: 서울시 관악구 봉천7동 1596-7

공장: 전라북도 익산시 석암동 649

우수약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체