

위염·위궤양 치료제

리바미드정

(레바미피드)

[작용·특징]

1. 리바미드정은 위내 염증 억제형 방어인자 증강제입니다.
2. 리바미드정은 H.pylori, 위산, NSAIDS등 각종 약물 및 stress등의 공격 인자로 인한 점막의 손상에 대하여 위내 방어인자를 증강시켜 위염을 억제합니다.
3. 리바미드정은 위점막에서 prostaglandin의 생합성을 증가시켜 위액으로 인한 위점막의 손상을 억제합니다.
4. 리바미드정은 염증성 cytokine의 생성을 감소시켜 염증반응을 개선시킵니다.
5. 리바미드정은 Hydroxy radical의 소거작용으로 백혈구의 Super oxide 생성을 억제하여 위점막의 손상을 방어합니다.
6. 리바미드정은 혈중이행도가 낮아 전신부작용 및 약물상호작용이 거의 없어 안전하게 사용할 수 있습니다.

[성분·함량] 1정(175mg) 중

1. 레바미피드(KPC) 100mg

[성상] 백색의 원형 필름 코팅정**[효능·효과]**

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

[용법·용량]

1. 위궤양 : 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 아침, 저녁 및 취침전에 경구투여한다.
2. 다음 질환의 위점막병변 (미란, 출혈, 발적, 부종) 의 개선 :
급성위염, 만성위염의 급성악화기 보통 성인에게는 1회 1정(레바미피드로서 100밀리그램)을 1일 3회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약성분에 과민증 병력 환자
2. 이상반응
여기서 '드물게'는 0.1% 미만을, '때때로'는 0.1~5% 미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5%이상 또는 빈도불명을 의미함
1) 중대한 이상반응
① 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
② 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ -GTP, ALP상승 등을 수반하는 간기능 장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 기타 이상반응
① 과민증 : 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민증상, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
② 정신신경계 : 마비, 어지러움, 졸음 등 이 나타날 수 있다.
③ 소화기 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
④ 혈액 : 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 임파구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소 등이 나타날 수 있다.
⑤ 기타 : 유선부종, 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 월경이상, 심계항진, 발열, 인면홍조, 혀의 마비, 숨가쁨, 또는 드물게 BUN상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부 및 수유부에 관한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.
4. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용경험이 적다.)
5. 고령자에 대한 투여
고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비고령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리 기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
3) 다른 용기에 넣을 경우 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 반드시 원래의 용기에 보관하십시오.

[저장방법] 차광 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)**[포장단위]** 100정, 500정**[사용기간]** 제조일로부터 36개월**[소비자상담실]** 02-568-0051**[반품 및 교환처]** 02-525-0725

본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

본 제품은 재정경제부고시 소비자피해보상규정에 의거, 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다.

의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서 개정일 : 2005년 5월