

메조카 주사

(안식향산나트륨카페인)

분류번호 : 211

【원료약품 및 그 분량】

1밀리리터 중
안식향산나트륨카페인(약전) 110.0밀리그램

【성 상】

무색의 액이 들어있는 무색투명한 앰플

【효능·효과】

1. 척추천자에 의한 두통
2. 알코올 또는 모르핀 중독에 의한 호흡억제시 호흡흥분 보조제

【용법·용량】

성인 : 안식향산나트륨카페인으로 1회 100~500mg 근육 또는 피하주사한다.
긴급할 경우에는 정맥주사할 수 있다.

소아 : 체중 kg당 8mg을 같은 방법으로 주사한다. 필요한 경우 4시간마다 반복주사한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 위궤양 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 심장병 환자
 - 3) 녹내장 환자
 - 4) 이 약에 과민증 환자
3. 부작용
 - 1) 소화기계 : 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 순환기계 : 빈맥, 심계항진, 기외수축 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 중추신경계 : 불면, 흥분, 진전, 어지러움, 동공확대, 섬광안검(Scintillation-Scotoma), 이명 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 눈 : 만성 녹내장을 악화시킨다는 보고가 있다.
 - 5) 기타 : 무력감이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
이 약을 과량투여할 경우 우울증 환자를 더욱 우울하게 만들 수 있으므로 1회 용량이 1g 을 넘지 않도록 한다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
카페인은 태반을 통과하며 모유중으로 쉽게 이행되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 장기연용을 피한다.
6. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
7. 적응상의 주의
 - 1) 정맥주사를 할 경우에는 주사속도를 느리게 한다.
 - 2) 주사바늘은 작은 것을 사용한다.

【저장방법】

밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

2밀리리터 × 50앰플

- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인할 수 있습니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원



명문제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 901-1
www.mmp pharm.co.kr

〈설명서작성년월:06. 1〉

〈M01〉