

고단위 소염·효소제

벨라제 정 45mg

(브로멜라인)

■원료약품의 분량 1정 중

브로멜라인(별규) 45mg(225FIP 역가)

■성상

연분홍색의 타원형 장용성 필름코팅정

■효능·효과

○ 부종을 동반한 염증 증상의 완화, 외상 또는 수술 후의 부종

■용법·용량

○ 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 45~90mg(1~2정), 1일 3회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
 - 심한 간 또는 심한 신질환 환자(혈액투석환자 등)
 - 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
 - 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 12세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
 - 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■저장방법 기밀용기, 25℃이하 보관

■사용기간 제조일로부터 24개월

■포장단위 100, 500정

본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 개정일자 : 2005.8.19(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ukp.co.kr)나 전화(02-489-3611)로 확인할 수 있습니다.)



한국유니온제약(주)
UNION KOREA PHARM CO., LTD.
강원도 원주시 문막읍 반계리 5-9