

비항콜린성 위장관 운동조절제

티알피정

Tiropamide Hcl 100mg

TRP Tab.

과민성 대장증후군(IRS)은 전체 인구의 7~15%가 의심되는 증상을 갖고 있을 정도로 소화기질환중 가장 흔한 질환중 하나로, 구조적 질환을 제외하면 병태생리학정 원인이 장의 운동이상이나 심리적 원인으로 생각되고 있습니다.

티알피정은 위와같은 장의 평활근(smooth muscle)에서 근육이 과도하게 수축되어 나타나는 통증에 대해 c-AMP의 양을 증가시켜 근육의 과도한 수축을 억제함으로써 통증을 제거해 줍니다. 항콜린제제의 식전 투여도 이런 통증을 경감시켜주지만 구강건조증, 동공산대, 배뇨 지연 및 빈맥의 전신적인 항콜린제의 부작용을 가지고 있는 반면, 티알피정(염산티로프라미드)는 항콜린제와 같은 부작용을 갖고 있지 않습니다. 또한 근질세포망(SR)에 칼슘이온을 저장시켰다 필요시 다시 방출함으로써 장관의 운동을 정상화시켜 줍니다.

티알피정은 국내 대학병원에서 건강한 지원자를 대상으로 한 실험에서 생물학적동등성이 입증되었습니다.

[원료약품의 분량] 1정중

염산티로프라미드(별규) 100mg

[성상] 백색 원형의 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 :
간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 :
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

[용법·용량]

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 대해 과민성이 있는 환자
 - 4) 중증 간부전 환자
2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 항콜린 작용을 나타내지 않으나 녹내장 또는 전립선 비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중단한다.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화 효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임신부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독 하에서 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 자사포장단위

[사용기간] 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

HUTECS

한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 051015

설명서 개정일 051015