

마 이 다 정

Myda Tablet

원료약품의 분량 1정 중

수산화마그네슘(U.S.P.)	500mg
우르소데스옥시콜린산(약전)	10mg
노회엑스(E.P.)	100mg
[히드록시안트라센유도체(바바로인)으로서 20.0mg]	

성 상

분홍색의 장방형 필름코팅정제

효능·효과

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

용법·용량

1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 심한 복통 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 신장에 환자
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 소아에 대한 투여
 - 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관한다.
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30, 500 정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2006.12.22

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

주식회사 휴온스

경기도 화성시 향남면 상신리 907-6
907-6, Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea

Huons