

에센비정

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

질산치아민(약전)	1.5mg
니코틴산아미드(약전)	13.0mg
아스코르빈산 97%과립(별규)	72.1mg
(아스코르빈산으로서 69.94mg)	
피토나디온 5%건조분말(별규)	1.00mg
(비타민 K로서 0.05mg)	

■ 성상 : 진한갈색을 띤 사각형의 필름코팅정

■ 효능·효과 : · 다음의 경우 비타민 B1, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력 저하

■ 용법·용량 : 8세 이상 및 성인 : 1회 1정씩, 1일 2회 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증 환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부·수유부
 - 4) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여합니다.
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 설사, 묽은 변이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여합니다.
 - 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
5. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사 포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800 에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 작성년월일 : 2004. 08. 31.
 ※ 설명서 개정년월일 : 2007. 01. 03.