

로콜연질캡슐 300캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

홍화유(유.에스.피)	333.33mg
초산토코페롤(약전)	6.67mg
염산피리독신(약전)	0.67mg
파라옥시안식향산메틸(약전)	0.08mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.02mg

【성상】

유백색의 유상물질이 든 주황색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

비만증, 당뇨병 · 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

【용법·용량】

1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용한다

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
구성 성분에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
 - 3) 파킨슨병 치료제인 “레보도파” 성분의 의약품

을 이 약과 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약될수 있으므로 이 약과 함께 사용시 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날수 있다.
- 2) 피부 : 발진, 발적이 나타날수 있다.
- 3) 이약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

- 2) 직사일광선을 피하고 될수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 300캡슐

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조 · 판매원

(설명서작성년월 : 06 . 1)

명문제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 901-1

www.mmpfarm.co.kr

제조번호 :

사용기한 :



8 806105 220600