

과학적 처방의 복합 활성 비타민제

토비코민-큐정

Tobicomin-Q Tablet

분류번호 312

토비콤-S 연질캡셀 등의 우수한 영양양제 개발에 앞장 서 왔던 안국약품(주) 부설중앙연구소에서는 오랜 기간의 연구개발을 통해 과학적 처방에 근거한 차세대 복합 활성 비타민제인 토비코민-큐정을 신제품으로 발매하게 되었습니다. 토비코민-큐정은 현대인들의 각종 스트레스와 불균형적인 식사, 그리고 환경적 요인으로 인해 부족하기 쉬운 필수 영양소들을 효과적으로 공급해 줄 뿐 아니라, 뛰어난 항산화 작용과 신경 및 근육 기능의 활성화 작용을 바탕으로 혈액 순환 개선 및 육체 피로 회복에 탁월한 약효를 발휘하는, 기존 제품들과는 차별화가 이루어진 복합 활성 비타민제입니다. 특히 비타민 E의 활성화를 통한 항산화 작용의 배가 효과와 노화 및 심혈관 질환 예방 효과로 주목 받고 있는 코엔자임 Q10(유비데카레논)을 함유하여 디지털 시대 현대인들의 욕구를 충족시켜 줄 차별화된 비타민제입니다.

■ 성분·함량 : 1정 중

푸르셀티아민(식품의약품안전청고시 제98-127호)(활성비타민B1:TTFD)·····	50mg
낙산리보플라빈(약전)(활성비타민B2)·····	6mg
인산피리독살(식품의약품안전청고시 제98-127호)(활성비타민B6)·····	10mg
초산히드록소코발라민(약전)(활성비타민B12)·····	5.22 μ g
(히드록소코발라민으로서 5 μ g)	
50%초산토코페롤(별규)(비타민E)·····	100mg
(초산토코페롤로서 50mg)	
니코틴산아미드(약전)·····	20mg
γ -오리자놀(식품의약품안전청고시 제98-127호)·····	5mg
이노시톨(약전)·····	30mg
판토텐산칼슘(약전)·····	30mg
비오틴(USP)·····	250 μ g
주석산수소콜린(DAB)·····	50mg
유비데카레논(약전)(코엔자임 Q10)·····	2.5mg

■ 성 상 : 적색의 장방형 필름코팅정입니다.

■ 약리작용 및 특징

- 1.뛰어난 항산화 효과
항산화 작용을 갖는 토코페롤(Vitamin E)과 코엔자임 Q10(Coenzyme Q10)이 복합 처방되어 있으므로, 체내에 형성된 유해한 유리기(free radical)를 효과적으로 제거합니다. 또한, 코엔자임 Q10은 토코페롤을 활성형 상태로 변환시킴으로써 배가된 항산화 효과를 발휘하도록 해 줍니다. 이를 통해 혈액 순환을 개선하고 눈의 피로를 회복하는 데 탁월한 약효를 발휘합니다.
- 2.신경 및 근육 기능의 활성화 작용
과학적 처방에 의해 배합된 활성형 비타민 B군 성분들은 체내에서 보효소(coenzyme)로 전환되어 신경과 근육에 쌓인 피로 물질(lactate)을 분해, 배설시키는 작용을 합니다. 또한, 체내 에너지 대사를 원활하게 함으로써 신경과 근육의 기능을 활성화하여 육체 피로와 눈의 피로를 효과적으로 회복시켜 줍니다.
- 3.활성 비타민의 이상적 배합
토비코민-큐정에는 활성비타민(푸르셀티아민, 낙산리보플라빈, 인산피리독살, 초산히드록소코발라민)이 이상적으로 배합되어 있습니다. 활성비타민은 장으로 흡수가 잘 되어 높은 혈중 농도를 나타내며, 신경과 근육 조직으로 이행이 잘 되어 장기간 지속적으로 작용합니다.

■ 효능·효과

- 1.다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, E 의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 2.다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 3.눈의 피로
- 4.각기
- 5.말초 혈행 장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목 결림, 수족저림·수족냉증

■ 용법 · 용량

8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정씩 1일 2회 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부

3. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
- 레보도파

6. 임상검사치에의 영향

요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 사용기한 : 외부포장참조

■ 본 제품은 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다. 안국약품(주)
• 소비자 상담실 TEL. (02)3289-4253~9, 4275~7 • 수신자부담 Tel. 080-001-4125

AG030612



건강의 등불

인국약품(주)

• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75 • 공장: 경기도 화성시 향남면 상신리 903-2