

프라스칼-D 정 750mg

PRASCAL-D Tablets

분류번호 : 321

■ 성분 · 함량

1정 중

구연산칼슘(USP) 750.0mg

(칼슘으로서 158mg)

건조콜레칼시페롤(별규) 4.0mg

(비타민D로서 400IU)

■ 성상 : 백색 장방형 정제

■ 효능 · 효과

1. 칼슘결핍 및 칼슘의 보급
2. 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
3. 비타민 D의 보급 : 임신 · 수유기, 발육기, 노년기

■ 용법 · 용량

1일 1회, 1회 2정을 식후 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 12개월 미만의 영아
 - 4) 신결석 환자
 - 5) 중증의 신부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 구토, 피부발진
 - 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
 - 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
6. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
 - 1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는
구입처를 통해 교환하여 드립니다.

문안작성일 : 2007년 2월 12일

이 설명서 작성일자 2007년 2월 12일 이후 변경된 내용은 www.asiapharm.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

아주약품공업주식회사

경기도 평택시 모곡동 439번지

www.asiapharm.co.kr

소비자상담실 : 080-256-8000

PDT 201-01