

진경제

알피움정

브롬화시메트로피움

 동화약품공업주식회사

분류번호:124(진경제)

【원료약품의 분량】 1정 중

브롬화시메트로피움(Cimetropium Bromide, 별규)

..... 50mg

【성상】 백색의 원형정제

【효능·효과】 위장관계·담도계·비뇨기계의 경련 및 기능적 운동장애, 간산통, 신산통, 월경곤란

【용법·용량】 성인 : 브롬화시메트로피움으로서 1회 50mg 1일 3회 투여하십시오

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

- 1) 전립선비대 환자
- 2) 요폐환자
- 3) 장폐색, 유문협착 환자
- 4) 녹내장 환자
- 5) 근무력증 환자
- 6) 이 약에 과민증 환자
- 7) 거대결장 환자
- 8) 회장마비 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

- 1) 자율신경계 질환 환자
- 2) 간·신질환 환자
- 3) 갑상선기능 항진증 환자
- 4) 관상동맥질환 환자
- 5) 울혈성 심부전 환자
- 6) 부정맥 환자
- 7) 고혈압 환자
- 8) 이상 고열증 소아

3. 부작용

1) 고용량 사용할 때 시조절장애, 빈맥을 동반한 심계 항진, 감각 장애가 나타날 수 있습니다.

2) 배뇨곤란, 안내압 증가, 두통, 어지러움, 다행증, 졸음, 무력, 변비, 구역, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

이 약에 약해 졸음이 나타날 수 있으므로 이 약 투여 중 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의하십시오.

5. 상호작용

페노치아진계 약물, 항우울약, 항히스타민제, 기타 다른 항콜린성 약물과 병용하지 않습니다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

7. 과량투여시의 처치

과량 투여에 의한 급성 중독일 경우에는 살리실산피소스티그민 1~2mg을 근육 주사하고 중후에 따라 적절한 처치를 하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관

【포장단위】 알피움정 300정

【문의전화】 본사 : (02) 778-4331~9

소비자상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

• 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고 설명서가 훼손되지 않도록 하십시오

• 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 재경부고시 소비자피해 보상 규정에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2005년 12월) 이후 변경된 내용은 [www. Dong-wha .co.kr](http://www.Dong-wha.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

본사 : 서울특별시 중구 순화동 5번지
공장 : 경기도 안양시 만안구 안양동189



분리배출
01L601

제조번호 :

사용기한 :



8 806016 519015