

## 【원료약품 및 분량】 이 약 1정중

말레인산트리메부틴(식약청고시) ..... 100mg

## 【성 상】 백색의 원형정제

## 【효능·효과】

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장 궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성 대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

## 【용법·용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg, 1일 3회 식전에 경구투여한다.  
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## 【사용상의 주의사항】

## 1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복통, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.



의약품 분류번호 239

일반의약품

## 기타의 소화기관용약

한국콜마  
**말레인산트리메부틴정**  
 (100mg)

300정

- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

## 2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

## 3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

제조 번호 :

사용 기한 :

제조원 : 한국콜마 제약사업부 충남 연기군 전의면 신정리 618-3

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.