

SK 헤모원캡슐

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료



일반의약품

분류번호: 322

SK 헤모원 캡슐은 폴리사카리드철착염을 주성분으로 하여 흡수율이 우수하며 위장관 부작용, 음식물과 같이 복용시 흡수저하 등의 단점을 극복한 빈혈치료제입니다. 또한 기혈이 예방에 필수적인 염산과 적혈구 형성에 조효소로 작용하는 비타민인 시아노코발라민을 보강하여 더욱 우수한 빈혈 예방 및 치료효과를 나타냅니다.

※[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
폴리사카리드철착염 (식약청고시) 326.1mg
(철(Fe)로서 150.0mg)
폴산(약전) 1.0mg
시아노코발라민 (약전) 25.0 μ g

[성상] 얇은 갈색의 분말이 충전된 상, 하 주홍색 경질캡슐

[효능·효과] 철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 12개월 미만의 영아
 - 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
 - 비철결핍성빈혈 (예 : 비타민 B₁₂ 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염
 - 경구용테트라사이클린계 제제
 - 제산제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용 전 후에는 피할 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 신장애 환자

- 저단백혈증 환자
- 임부, 수유부
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 때때로 흥분, 피부질환, 가려움, 전신권태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
 - 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
 - 복부 · 위통증, 위 경련
 - 구토, 설사
 - 열, 혼수
 - 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종, 복통, 설사, 변비, 흑변, 위부 불쾌감
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 대량투여로 인해 복부 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈, 지혈암, 고나트륨혈증, 유헤혈성심부전, 부종, 빈맥, 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 한다.
 - 이 약에 함유된 염산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B₁₂제제와 병용한다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의할 것.
 - 아스코르브산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60, 120캡슐

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질 · 변패 · 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 전화(02-2008-2900)를 통해 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

제 조 자 :  **서흥캡슐** 제조의뢰자 :  **SK 케미칼** 생명과학부문
경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317 경기도 안산시 단원구 복내동 474-3

자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

[제품상담 전용전화(무료)] : 080-021-3131

2002. 07. 작성

※2008. 05. 09 개정