

천연철단백 빈혈예방치료제

일반의약품
분류번호 322
KGMP
적격업체제품

레디페린[®]-에프 캡슐

레디페린-에프[®]캡슐은 천연철단백인 페리친과 조혈비타민으로 폴산과 시아노코발라민이 고단위로 복합처방된 조혈영양제입니다.

레디페린-에프[®]캡슐에 함유된 페리친은 생리활성형 천연철단백으로 필요시 즉시 이용 가능한 인체내 저장철의 형태로써, 생체내 이용률이 높고, 철분제제에서 문제시 되었던 오심, 팽만감, 속쓰림, 변비 등의 위장장애가 적은 장점을 지닌 진보된 조혈(영양)제입니다.

레디페린-에프[®]캡슐은 페리친 외에 조혈비타민으로서 핵산합성에 중요한 역할을 하는 폴산과 시아노코발라민이 고단위 복합처방되어 각종 빈혈에 우수한 치료효과를 발휘하며, 특히 철분과 비타민이 생리적으로 많이 요구되는 여성의 빈혈 예방 및 치료에 효과적으로 사용할 수 있는 안전한 제제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

철단백추출물(별규)	155mg
	(페리친성 철로서 20 mg.)
시아노코발라민(KP)	500µg
폴산(KP)	800µg

■ 성상 : 적갈색의 분말이 든 적색의 경질캡슐제

■ 약리작용 및 특징

1. 레디페린[®]-에프캡슐은 생리활성형의 저장철단백인 페리친을 함유하므로, 철분 제제에서 문제시되던 위장장애가 적고 복용후 흡수율이 높으며, 필요시 즉시 활성화 되어 피로감, 무력감, 두통, 어지럼증, 귀울림 등 빈혈에 의한 증상을 신속히 개선시켜 줍니다.
2. 레디페린[®]-에프캡슐은 적혈구를 생성하여 혈액을 공급하는 페리친과 핵산합성에 중요한 역할을 함으로써 신체에 활력을 주는 폴산과 시아노코발라민이 고단위로 복합되어 있어 철결핍성빈혈 등 각종 빈혈치료에 효과적일 뿐 아니라 빈혈로 인한 신체무력증, 병중 · 병후 · 수술 후 허약해진 환자의 신속한 쾌유를 도와줍니다.
3. 레디페린[®]-에프캡슐은 페리친외에 조혈비타민으로 시아노코발라민과 폴산이 복합 처방되어 있으므로 철분과 비타민이 생리적으로 많이 요구되는 여성의 빈혈 예방 및 치료에 효율적인 안전한 제제입니다.

■ 효능 · 효과

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료, 궤양성대장염 및 위 · 십이지장궤양 등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈

■ 용법 · 용량

성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 1회, 1회 1캡슐씩 식후 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2) 12개월 미만의 영아
3) 혈액소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
4) 비철결핍성 빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염
2) 경구용테트라사이클린계 제제
3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용중, 복용전후에는 피할 것.
5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
4) 신장애 환자
5) 저단백혈증 환자
6) 항알도스테론제, 트리아메텐과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
7) 퀴놀론계, 페니실라민, 클로람페니콜, 네오마이신, 콜레스티라민, 췌장엑스 및 비타민 D와 같은 물질을 복용하는 사람
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
2) 복부 · 위통증, 위 경련
3) 열, 혼수
4) 구역, 구토, 식욕부진, 설사, 변비, 위부불쾌감
5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
2) 어린이에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용할 것.
3) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의할 것.
4) 천연 페리친의 경구 복용으로 위장장애가 나타날 확률은 극히 드물다.
5) 변비, 구역, 설사, 위통과 같은 병발증상은 대부분의 경우 경미하고 일시적인 것이므로 이로 인해 투약을 중지할 필요는 없다.
6) 아스코르브산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

■ 포장단위

60캡슐 (30캡슐×2)

※ 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 11월 7일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

10009
LFC-03-06-1171

SAMJIN

제조판매원

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6