

천연 생체철단백 조혈제

일반의약품

분류번호:322

헤모드림

캡슐

(천연 철결합 단백질 Ferritin 함유)

헤모드림캡슐의 주성분인 페리친은 순수한 말의 비장에서 분리 추출된 천연 철결합 단백질로서 체내에서 철분 필요시 단백질로부터 유리되어 바로 생체내에 이용될 수 있는 저장철 형태의 유일한 생리활성형 철단백입니다.

임신·수유시에는 평상시보다 몇배 많은 양의 조혈청 성분이 요구되는데 페리친은 화학합성 철과는 달리 인체내 저장철과 가장 유사한 구조의 추출물로 만들어져 흡수율이 높고 위장장애 등 부작용이 거의 없어 우수한 조혈효과를 발휘합니다.

헤모드림캡슐은 페리친, 2종의 비타민 B가 복합처방되어 핵산합성 및 조혈작용에 중요한 역할을 하며 복용이 간편하고 흡수 및 효력이 빠른 이상적인 철단백제제입니다.

성상

적갈색의 분말이 든 적색의 경질캡슐제

성분·함량

1 캡슐 중	
철단백추출물(별규)	155mg
(페리친 철로서 20mg)	
시아노코발라민(약전)	500 μ g
엽산(약전)	800 μ g

효능·효과

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
2. 궤양성 대장염 및 위·십이지장궤양 등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈

용법·용량

성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 1회, 1캡슐 식후 복용

사용상의 주의사항

1. 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
 - 3) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
 - 4) 비철결핍성 빈혈(예 : 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염
 - 2) 경구용테트라사이클린계 제제
 - 3) 제산제
4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

사용상의 주의사항

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오)
 - 7) 퀴놀론계, 페니실라민, 클로람페니콜, 네오마이신, 콜레스티라민, 철장엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
 - 2) 복부·위통증, 위 경련
 - 3) 열, 혼수
 - 4) 구역, 구토, 식욕부진, 설사, 변비, 위부불쾌감
 - 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 어린이에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용하십시오.
 - 3) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 4) 천연 페리친의 경구 복용으로 위장장애가 나타날 확률은 극히 드뭅니다.
 - 5) 변비, 구역, 설사, 위통과 같은 병발증상은 대부분의 경우 경미하고 일시적인 것이므로 이로 인해 투약을 중지할 필요는 없습니다.
 - 6) 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포장단위

30, 60, 120캡슐

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 지점이나 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 "소비자피해보상규정"에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

P0601-02