

천연 철단백 조혈제

일반의약품

플러스
웨러진 캡슐

* 이 약을 복용하기 전에 아래 내용을 주의 깊게 읽으시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

[작용·특성]

웨러진플러스캡슐은 건강한 말의 비장에서 추출한 천연 단백질인 페리친과 엽산, 시아노코발라민이 이상적으로 복합 처방된 제제로 생체이용률이 높고 위장장애가 낮아 철결핍성 빈혈, 궤양성대장염 및 위십이지장궤양 등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈의 예방 및 치료에 효과적인 제제입니다.

특히 말 비장에서 추출한 페리친은 인체의 저장철과 형태가 유사하며 심장이나 간에 저장된 페리친보다 철 함량이 높아 빈혈치료에 우수한 조혈제제입니다.

[조성·성상]

- 원료의약품의 분량 : 1캡슐 중
 철단백추출물(별규) 155mg
 (페리친성 철로서 20mg)
 시아노코발라민(약전) 500 μ g
 엽산(약전) 800 μ g
- 성상 : 적갈색의 분말이 든 적색의 경질캡슐제입니다.

[효능·효과]

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료, 궤양성대장염 및 위십이지장궤양 등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈

[용법·용량]

성인 및 12세 이상 어린이 1일 1회 1캡슐 식후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 경고
 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 2) 12개월 미만의 영아
 3) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
 4) 비철결핍성 빈혈(예 : 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 1) 인산염, 칼슘염
 2) 경구용 테트라사이클린계 제제
 3) 제산제
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계 기능 장애 환자
- 4) 신장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 7) 퀴놀론계, 페니실라민, 클로람페니콜, 네오마이신, 콜레스티라민, 췌장엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 상당 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출 시 피부 과민반응
- 2) 복부·위 통증, 위 경련
- 3) 열, 혼수
- 4) 구역, 구토, 식욕부진, 설사, 변비, 위부불쾌감
- 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부기 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용하십시오.
- 3) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 천연 페리친의 경우 복용으로 위장장애가 나타날 확률은 극히 드뭅니다.
- 5) 변비, 구역, 설사, 위통과 같은 병발증상은 대부분의 경우 경미하고 일시적인 것이므로 이로 인해 투약을 중지할 필요는 없습니다.
- 6) 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 잘못된 사용과 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[주의]

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 웨러진플러스캡슐 30, 60, 120캡슐

* 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입한 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격업소 제품

103·070105



종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 3가 368
 공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)

* 이 설명서 작성일자(2006년 9월 18일) 이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인하실 수 있습니다.