



■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

홍화유 (U.S.P)	333.33mg
초산토코페롤 (약전)	6.67mg
염산피리독신 (약전)	0.67mg
파라옥시안식향산메칠 (약전)	0.08mg
파라옥시안식향산프로필 (약전)	0.02mg

■ 성상 : 유백색의 유상액이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

■ 효능·효과 : 비만증, 당뇨병, 본태성고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사의 개선

■ 용법·용량 : 1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
구성 성분에 과민증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
3) 파킨슨병 치료제인 '레보도파' 성분의 의약품을 이 약을 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약될 수 있으므로 이 약과 함께 사용 시 신중히 투여합니다.
- 부작용
1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
2) 피부 : 발진, 발적이 나타날 수 있습니다.
3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

FM184015

비만증 및 고콜레스테롤 혈증 치료제

콜레논

연질
캡슐

500캡슐



(주) 드림파마

5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일에 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 용량을 지킵니다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

연질캡슐 특성상 고온에서 엉겨붙을 수 있으므로 보관에 주의하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일 : 2004. 08. 18

경기도 화성시 향남면 상신리 902-3

※ 개정년월일 : 2005. 01. 28

제조번호

사용기한

