

오페나딘서방정 50mg

(구연산오페나드린)

【성분·함량】 1 정중

구연산오페나드린(U S P) 50mg

【성상】 흰색 내지 미백색의 서방성 원형정제

【효능·효과】 안정, 물리적 요법 및 근골격의 급성통증상태 완화의 보조.

【용법·용량】

성인 : 구연산오페나드린으로서 1회100mg(2정) 1일 2회(아침, 저녁)에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1) 녹내장 환자 | 2) 유문 및 십이지장폐색 환자 |
| 3) 협착성 소화성 궤양 환자 | 4) 전립선 비대 및 방광경부폐쇄 환자 |
| 5) 분문연축(거대식도) 환자 | 6) 근무력증 환자 |
| 7) 이 약에 과민증 환자 | 8) 수유부 |

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- | | |
|------------|------------------------------|
| 1) 빈맥 환자 | 2) 비대상성 심부전, 관상동맥부전 및 부정맥 환자 |
| 3) 거대결장 환자 | |

3. 이상반응

- 이 약의 부작용은 항콜린작용에 기인하며 보통 고용량과 관계가 있다. 최초로 나타나는 부작용은 구갈이다.
- 빈맥, 심계항진, 요저류 및 요폐, 시야몽롱, 동공산대, 안압증가, 쇠약, 구역, 구토, 두통, 어지러움, 변비, 졸음, 과민반응, 가려움, 환각, 격양, 진전, 위자극, 발한 감소, 드물게 두드러기 및 기타 피부병 등이 나타날 수 있다.
- 경구투여시 매우 드물게 재생 불량성 빈혈이 보고되어 있으나 이 약과의 상관성은 명확하지 않다.
- 이 약의 근육주사시 매우 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 이 약의 연속적인 장기사용에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 장기 사용시에는 정기적으로 혈액, 요, 간·신기능 검사를 실시한다.
- 때때로 두통, 어지러움, 실신 등이 나타날 수 있으므로 위험한 기계조작이나 자동차 운전을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

- 프로폭시펜과 이 약의 병용투여시 상가작용에 의해 착란, 불안 및 진전이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 용량을 감소하거나 한 성분 또는 두 성분의 투여를 중지한다.
- 레보도파와 병용투여시 레보도파의 항킨슨작용이 증강될 수 있다.
- 이 약과 아만타딘, 퀴니딘, 삼·사환계 항우울약, 항정신병약의 병용투여시 이들 약물의 항콜린작용이 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 이 약의 주사시 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 소아에는 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여

때때로 이 약을 투여받는 고령자에서 착란이 나타날 수 있으며 이러한 부작용은 이 약을 감량함으로써 사라질 수 있다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 차광하여 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

【포장단위】 300정

보험코드: A06602161

※ 본 제품은 우수 의약품 제조관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다만 혹시 유통과정중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국에서 즉시 교환하여 드립니다.

※ 이 제품 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

개정년월일 : 2006. 8.17