



딜라스트[®] 캡슐

전문의약품

이부딜라스트
뇌혈관 장애 개선제

이 약을 복용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

작 용 • 특 성 : 딜라스트 캡슐은 생체내 cAMP 및 cGMP 분해효소인 PDE를 비선택적으로 억제합니다. 결과적으로 체내의 cAMP 와 cGMP 농도가 상승하여 세포보호(cytoprotection), 항혈소판(antiplatelet), 혈관이완(vasodilation)이 나타나는 우수한 뇌혈관 장애 개선제입니다.

조 성 • 성 상 : 1. 원료약품의 분량 :

이 약 1캡슐 중

이부딜라스트(별규) 10mg

2. 성상 : 흰색 내지 미황색의 서방성과립을 함유하는 상·하부 흰색의 경질캡슐제입니다.

효 능 • 효 과 : 뇌경색후유증에 따른 만성 뇌순환장애로 인한 어지럼증의 개선

용 법 • 용 량 : 뇌혈관 장애인 경우 : 이부딜라스트로서 보통, 성인 1회 10mg을 1일 3회 경구투여합니다.

증상에 따라 적의 증감합니다.

사 용 상 의 : 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

주 의 사 항 두개내 출혈시 지혈이 완성되지 않은 것으로 추정되는 환자
(지혈이 지연될 수 있습니다.)

2. 다음 환자에는 신중하게 투여하십시오.

1) 뇌경색 급성기 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)

2) 간기능장애가 있는 환자

3) 고령자('고령자에 대한 투여'항 참조)

3. 이상반응

1) 과민증 : 때때로 발진이 나타날 수 있고 드물게 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.

2) 정신신경계 : 때때로 현훈, 두통 또는 드물게 열감, 진전, 불면증, 졸리움, 무감동 등이 나타날 수 있습니다.

3) 소화기 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량 또는 드물게 복부팽만감, 설사, 위궤양 등이 나타날 수 있습니다.

4) 순환기 : 드물게 심계항진, 기립성 저혈압, 흉조 등이 나타날 수 있습니다.

5) 혈액계 : 혈소판 감소증이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 해야 합니다. 드물게 빈혈이나 백혈구감소증이 나타날 수 있습니다.

6) 간장 : 때때로 S-GOT, S-GPT, ALP, γ -GTP의 상승이나, 드물게 총 빌리루빈의 상승을 동반한 간기능장애 및 황달이 나타날 수 있으며, 이러한 이상반응이 나타났을 경우에는 투여를 중지하고 적절한 치료를 해야 합니다.

7) 기타 : 드물게 권태감, 이명, 안면부종, 부유감, 미각 이상 등이 나타날 수 있습니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험(랫트)에서 신생자의 발육지연 및 생후 4일 생존율저하 등이 보고된 바 있으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

- 2) 동물실험(랫트)에서 모유중으로 이행됨이 보고된 바 있으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
5. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)
6. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 간에서 대사됩니다. 고령자는 종종 간기능이 저하되어 이 약의 혈중 농도가 지속적으로 상승할 가능성이 있으므로, 용량에 주의를 기울여 투여하여야 합니다.
7. 적용상의 주의
이 약은 서방성제제이므로 캡슐 내용물을 꺼내어 조제하지 말아야 합니다.
8. 기타
이 약을 뇌동맥경화증에 사용하는 경우, 명백히 뇌동맥 경화로 인한 뇌순환부전에 의한 것으로 판단되는 자각증상 및 정신 증상을 가진 환자로서, 국소 뇌증상이나 뇌 CT 소견상 이상이 없음이 확인된 환자에게만 투여합니다.
9. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 뚜껑을 잘 닫아 보관하십시오.
- 4) 실리카겔을 먹지 마십시오. 실리카겔이 물에 닿으면 화상을 입을 수도 있으니 주의하시기 바라며, 제품에 실리카겔이 혼입되어 있는 경우 구입처를 통하여 교환하십시오.
- 5) 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 딜라스트 캡슐 10, 30, 100캡슐

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

® = 등록상표

101 · 050307



중근당

본사: 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장: 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실: 080-6776-080(수신자 부담)

이 설명서 작성일자(2007. 6. 1)이후 변경된 내용은 중근당 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.