

생 약 제 제

쉬 정

방기황기당건조엑스

360정

Huons

일반의약품/분류번호 : 114

■ 원료의약품의 분량 1정 중
방기황기당건조엑스(7.52→1)(별 7) ----- 244mg

■ 성 상
황금색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과
살색이 되고 피로하기 쉬우며, 땀이 잘 나는 사람의 다량
제출 : 8만승(근육에 긴장감이 없고 불충전), 관절통, 부종

■ 용법·용량
성인 1일 3회 1회 4정씩 식전 또는 식간 복용

■ 사용상의 주의사항
글리시리진산으로서 1일 최대량 40mg이상을 함유하는
제제는 장거 연약할 경우 자갈혈증, 혈압상승, 나트륨의
자유, 부종, 체중증가 등 위알도스테론증이 나타날 수
있으므로 주의하여 사용할 것 글리시리진산으로서 1일
최대량 40mg이상을 함유하는 제제는 장거 연약할 경우
자갈혈증, 혈압상승, 나트륨의 자유, 부종, 체중증가 등
위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용할 것
1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
1) 혈압이 높은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할
것.
2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자,
3) 부종이 있는 환자.

- 4) 의사의 처방을 받고 있는 환자.
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사,
약사와 상의할 것.
1) 본제의 복용에 의해 노갈이 감소하거나, 얼굴이나
손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무거거나, 손이 굳어지거나,
혈압이 오름거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우
에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g
이상의 제제는 장거 연약할 경우 자갈혈증, 혈압
상승, 나트륨 제역의 자유, 부종, 체중증가 등의 위알
도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨
치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우
복용을 중지할 것.
3) 근병증 : 자갈혈증의 결과로서 근병증이 나타나는
경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지
경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을
중지할 것.
3. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.
갑형항원체제, 갑형항원체제, 글리시리진산 혹은 그
염류 함유제제, 루프제 이뇨제(부로스미드, 에다크린산)
또는 차이저드제 이뇨제(토리클로르메치아이드)와 병용
시 위알도스테론증이나 자갈혈증으로 인하여 근병증
이 나타나는 경우므로 신중히 투여할 것.

■ 자시모정단위
가일용기, 실온(15~30℃)보관

본 의약품은 위대한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 유통과정에서
사용가능한 상태가 아니거나 변질, 변색, 누출 및 손상을 발견하여 불편
경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

주식회사 유온스 작성일 : 2008.06.15
경기도 화성시 향남읍 상안리 997-8
소재지 상담실전화 및 고객센터 : 020-447-4700

8809032126212



제조번호 :
사용기한 :