

프카인 크림

Feaine Cream

원료약품의 분량 1g 중

리도카인(약전)	25mg
프릴로카인(EP)	25mg
화산옥시마진황산염(약전)	1.5mg

성상

백색의 크림제

효능·효과

1. 주사해는 삽입시 또는 표재성 외과적 처치 시 피부의 표면마취
2. 생식기 질환 표면마취(예: 콘딜롬 제거전)

용량·용법

○ 성인

1. 피부 : 이 약을 적용한 후 얼봉태이므로 얼는다. 적용 부위에 대한 얼봉을 보통 1~3시간 유지되어야 하며 얼봉태이므로 제거 후 최소 1시간은 효과가 지속된다.
 - 1) 주사해는 삽입시(예: 정맥상관, 채혈) 이 약 약 2g을 최소 1시간, 최대 5시간 적용한다.
 - 2) 표재성 외과적 소수술시(예: 연속출(連續露)의 적출) 이 약 1.5 ~ 2g/10cm²를 1시간 적용한다.
 - 3) 표재성 외과적 대수술시(예: 파열된 피부마취) 이 약 1.5 ~ 2g/10cm²를 최소 2시간, 최대 5시간 적용한다.
 2. 생식기 질환 : 콘딜롬 제거시 처치 부위에 이 약 약 10g을 5~10분간 적용한 후 이 약을 제거하고 즉시 시술을 개시한다.
- 3개월 ~ 12개월 유아 : 총량 2g, 적용부위 15cm²를 초과하지 않는다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약의 성분 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증 환자
 - 2) 상처가 있는 부위, 창상, 접촉성피부염 또는 아토피피부염 환자
 - 3) 3개월 이하의 영아
 - 4) 에트헤모글로빈결핍증(貧血) 약물(설프아미드 등)을 투여하는 12개월 이하의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 빈혈, 에트헤모글로빈결핍증 또는 이러한 증상을 유발할 수 있는 약물 투여 환자
 - 2) 신장자, 고혈자, 급성 질환 환자
 - 3) 중증의 간질환 환자
3. 부작용
 - 1) 국소손상 : 때때로 국소창상, 발적, 부종, 드물게 가려움이 나타날 수 있다.

2) 기타 : 두드러기, 혈관성 부종, 기관지 공전, 속 등의 알레르기성 및 아니알러지성 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 프릴로카인의 비경구적 투여로 인하여 에트헤모글로빈결핍이 유발되는 것으로 알려져 있다.
- 2) 이 약의 사용법으로는 전신적인 독성 발현 위험성이 거의 없으나 독성 징후가 나타나는 경우에는 다른 국소마취제 투여 후와 비슷한 증후가 예상된다. 이 약물은 피부로부터 장신적으로 흡수되는 속도가 느리기 때문에 독성 징후를 나타낼 환자들의 증상을 치료하는 경우에는 몇 시간 동안 주의 깊게 관찰하여야 한다.

5. 상호작용

- 1) 에트헤모글로빈을 유도하는 약물(예: 설프아미드)과 병용투여시 에트헤모글로빈의 형성을 증강시킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 다른 국소마취제 또는 부정맥제(도카이나이드, 엑실레인 등)과 병용투여시 독성이 증강될 수 있으므로 주의한다.

6. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약은 당한 장액을 통과하니 치료 용량에서 생식 기능에의 영향은 보고되어 있지 않다.
- 2) 이 약은 모유로 분비되므로 주의한다.

7. 소아에 대한 투여

소아의 생식기 질환에는 적용하지 않는다.

8. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 약액 자극을 유발할 수 있으므로 눈 주위에 적용하지 않는다.
- 2) 기타의 국소마취제와 혼합가제로 이 약은 귀에 독성이 있을 수 있으므로 귀에 적용하지 않아야 하며 중이(middle ear)로 침투할 수 있는 처치 또는 전치술(pericardial)이 이 약을 사용하지 않는다.

9. 기타

프릴로카인의 대사생인 o-플루오리단을 고 용량 사용한 모트 및 마우스에서의 발암성 시험에서 비장과 방광에 암 발생 가능성이 증가했다. 이 결과를 사람에게 적용하기 어려우나 이 약의 고용량, 장시간 사용은 피한다.

저장방법

기밀봉기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10g × 1, 20 튜브

본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

각상징 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

각상징 : 2006.06.26

주식회사 휴온스

소비자 상담실(전화 및 교환지) : 080-447-4700

경기도 화성시 향남읍 송정로 307-5
307-4, Sangjin-e, Hwangnam-myeon,
Hwasung-city, Kyunggi-do, Korea

Huons