



하루신

서방정 0.2mg

HARUSIN SR Tablets

(염산탐스로신)

분류번호 : 259

■ 성분·함량

1정 중

염산탐스로신(별규) 0.2mg

■ 성상 : 흰색의 원형 필름코팅정제

■ 효능·효과 : 양성 전립선비대증에 따른 배뇨장애

■ 용법·용량

통상 성인은 염산 탐스로신 0.2mg을 1일 1회 식후에 경구투여한다.

단, 연령·증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 신기능 장애 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

기립성 저혈압이 있는 환자

3. 부작용

- 1) 실신, 의식상실(빈도불명) : 혈압저하에 동반하는 일과성의 의식상실 등이 나타나는 일이 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 균형감각의 이상이 나타날 수 있다.
- 3) 순환기계 : 때때로 빈맥이 나타날 수 있다.
- 4) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있기 때문에 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지해야 한다.
- 5) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 위부불쾌감, 위증감, 위통, 식욕부진이 나타날 수 있다.
- 6) 간장 : ALT, AST의 상승, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 이 약 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 7) 기타 : 때때로 연하장애, 인두부 작열감, 전신권태감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약을 과량투여할 경우 혈압저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 한다.
- 2) 신기능 장애가 있는 환자에 투여시 혈장중 농도의 과도한 상승이 나타날 수 있는데, 이 경우의 약물동태는 충분히 규명되어 있지 않으므로 신기능 장애 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.
- 3) 선자세(立位)의 혈압이 저하될 수 있으므로 체위변화에 따른 혈압변화에 주의한다.
- 4) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의하여 이 약 투여로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 조치를 고려해야 한다.
- 5) 어지러움 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 한다.
- 6) 이 약을 투여하기 전에 혈압강화제의 복용여부를 확인하여야 하며, 혈압강화제를 복용한 경우에는 혈압변화에 주의하고, 혈압저하가 나타날 경우에는 감량 또는 투여 중단 등 적절한 처치를 해야 한다.
- 7) 동물시험에서 단백질합 투여시 항원성을 나타내는 것으로 보고되었다.

5. 고령자에 대한 투여

고령자중에는 신기능이 저하된 환자가 있으므로 이러한 경우에는 0.1mg부터 투여하여 경과를 충분히 관찰한 후 0.2mg으로 증량한다. 0.2mg으로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 더 이상 증량하여 투여하지 말고 다른 적절한 처치를 해야 한다.

6. 복용상의 주의

이 약을 씹어서 복용하지 않도록 환자에게 주의시킨다.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

문안작성일 : 2006년 12월 22일

이 설명서 작성일자 2006년 12월 22일 이후 변경된 내용은 www.asiapharm.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



아주약품공업주식회사

경기도 평택시 모곡동 439번지
www.asiapharm.co.kr
소비자상담실 : 080-256-8000

HRT 201-01