

전립선비대증 치료제

전문의약품

삼천당

탐스로신 서방정 0.2mg

(염산탐스로신)

Tamsulosin HCl

SCD Tamsulosin S.R. Tab. 0.2mg

분류번호 : 259

■ 원료약품의 분량 (1정 중)

염산탐스로신(별규) ----- 0.2mg

■ 성 상 : 흰색의 원형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

양성 전립선비대증에 따른 배뇨장애

■ 용법 · 용량

통상 성인은 염산 탐스로신 0.2mg을 1일 1회 식후에 경구투여한다.
단, 연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것.

1)이 약에 과민증의 병력이 있는 환자

2)신기능 장애 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.

기립성 저혈압이 있는 환자

3. 부작용

1)실신, 의식 상실 (빈도불명) : 혈압저하에 동반하는 일과성의 의식상실 등이 나타나는 일이 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2)정신신경계 : 때때로 어지러움, 균형감각의 이상이 나타날 수 있다.

3)순환기계 : 때때로 빈맥이 나타날 수 있다.

4)과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있기 때문에 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지해야 한다.

5)소화기계 : 때때로 구역, 구토, 위부불쾌감, 위중감, 위통, 식욕부진이 나타날 수 있다.

6)간장 : ALT, AST의 상승, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 이 약 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

7)기타 : 때때로 연하장애, 인두부 작열감, 전신권태감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1)이 약을 과량투여할 경우 혈압저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 한다.

2)신기능 장애가 있는 환자에 투여시 혈장중 농도의 과도한 상승이 나타날 수 있는데, 이 경우의 약물동태는 충분히 규명되어 있지 않으므로 신기능 장애 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.

3)선자세(立位)의 혈압이 저하될 수 있으므로 체위변화에 따른 혈압변화에 주의한다.

4)이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하여 이 약 투여로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 조치를 고려해야 한다.

5)어지러움 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 한다.

6)이 약을 투여하기 전에 혈압강하제의 복용여부를 확인하여야 하며, 혈압강하제를 복용한 경우에는 혈압변화에 주의하고, 혈압저하가 나타날 경우에는 감량 또는 투여중단 등 적절한 처치를 해야 한다.

7)동물시험에서 단백결합 투여시 항원성을 나타내는 것으로 보고되었다.

5. 고령자에 대한 투여

고령자중에는 신기능이 저하된 환자가 있으므로 이러한 경우에는 0.1mg부터 투여하여 경과를 충분히 관찰한 후 0.2mg으로 증량한다. 0.2mg으로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 더 이상 증량하여 투여하지 말고 다른 적절한 처치를 해야 한다.

6. 복용상의 주의

이 약을 씹어서 복용하지 않도록 환자에게 주의시킨다.

■ 포장단위 : 10, 30정

■ 저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

만약 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드리겠습니다.

개정 : SD-2006-12-13

* 이 첨부문서 작성일자(2006년 12월 13일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.



제조 및 판매원

삼천당제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 904-1

대표전화 : (02)2679-0146, <http://www.scd.co.kr>