

■ 원료약품의 분량(1정중)

염산슈도에페드린(USP)60mg

■ 성 상 : 백색의 원형정제

■ 효능·효과 : 다음 질환에 의한 비충혈 : 감기, 부비강염, 알레르기 등 상기도질환

■ 용법·용량

• 성인 : 염산슈도에페드린으로서 1회 30-60mg, 1일 3-4회 경구 투여합니다.
1일 최대투여량은 240mg 입니다.

• 소아 : 1) 6-11세 : 1회 30mg, 2-5세 : 1회 15mg, 1일 3-4회 투여합니다.
1일 총 투여횟수는 4회를 초과하지 않습니다.

2) 6개월-1세 : 1회 15mg, 1일 2회 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) 고감신경흥분성 아민류에 과민증 환자 | 2) 심한 고혈압 환자 |
| 3) 심한 관동맥질환 환자 | 4) 갑상선기능항진증 환자 |
| 5) 당뇨병 환자 | 6) 수유부 |
| 7) MAO저해제를 투여중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 환자 | |

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) 전립선비대증 환자 | 2) 고혈압 등 심혈관질환 환자 |
| 3) 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자 | 4) 안내압상승 환자 |
| 5) 심한 간·신부전 환자 | |

3. 부작용

- 1) 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 부정맥, 안면창백, 저혈압을 수반한 심혈관허탈이 나타날 수 있습니다.
- 2) 정신신경계 : 편두통, 두통, 어지러움, 불안, 긴장, 무력감, 허약, 불면, 환각, 경련, 중추신경계 흥분 또는 억제 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 변비, 구역, 소화장애 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 5) 비뇨기계 : 때때로 요저류가 나타날 수 있습니다.
- 6) 기타 : 구갈, 발한 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

7일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 고열이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

비충혈제거제
슈다펜TM
(염산슈도에페드린) 정

1000정

5. 상호작용

- 1) 고감신경흥분약과 병용할 경우 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여합니다.
- 2) 클로로포름, 시클로프로판, 할로탄 등 할로겐화 마취제와 병용할 경우 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.
- 3) 고혈압약, 심한계 항우울약 등과 병용투여시에는 혈압을 관찰하면서 신중히 투여합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다.

7. 소아에 대한 투여 : 2세 미만의 영아는 약사 또는 의사의 지시에 따라 투여합니다.

8. 고령자에 대한 투여 : 고령자는 특히 이 약에 의한 부작용이 나타나기 쉽고 과량투여시 환각, 경련, 중추신경계 억제 및 사망을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.

9. 저장상의 주의사항 : 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보증을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 ■ 포장단위 : 1000정

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2006년 9월) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samapharm.co.kr)또는 전화(02-2056-7272)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

제조번호 :

사용기한 :

sama

삼아약품주식회사

경기도 의왕시 오전동 265
대표전화 : (02)2056-7200
제품문의전화 : (02)2056-7272
www.samapharm.co.kr



분리배출

