당뇨병성 다발성 신경병증 치료

K.G.M.P 적격업체제품

치옥티드 HR 정

(치옥트산)

전문 분류번호 399

치옥티드 HR 정은 독일에서 개발된 당뇨병성으로부터 기인된 신경병 치료제 로서 통증만 없애주는 대증치료제와는 달리 병인에 역행하는 작용기전으로 보다 근본적으로 증상을 치료합니다.
주성분인 치옥트산은 전세계적으로 오랫동안 안전하게 사용되어오다 1990년대 이후 그 효과가 과학적으로 입증된 약물로 당뇨병 환자에게 흔히 발생되는 합병증의 하나인 말초성 혹은 다발성 신경염을 완화시켜 줍니다.

【성분 · 함량】 1정 중
치옥트산(고시)……600mg

【성　　상】 녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능 · 효과】 당뇨병성 다발성 신경염의 완화

【용법 · 용량】
성인 1일 1회 치옥트산으로서 600mg을 충분한 물과 함께 아침식사 약 30분 전에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) α-lipoic acid 또는 기타 부형제에 대하여 과민증이 있는 환자
 2) 이 약은 소아 및 청소년을 대상으로 한 임상적 경험이 없으므로 투여하지 않는다.
2. 부작용
 1) 소화기계 : 드물게 오심, 구토, 위장관계 통증, 설사 등이 나타날 수 있다.
 2) 피부 : 드물게 피부발진, 두드러기, 가려움 등의 알러지 반응이 나타날 수 있다.
 3) 드물게 포도당 이용율 증가에 의해 혈당치가 떨어지는 경우가 있다. 이러한 경우, 어지러움, 발한, 두통, 시력장애와 같은 저혈당증 유사증상이 나타날 수 있다.
 4) 드물게 미각 장애가 보고되었다.
3. 일반적 주의
 알콜의 상습적인 복용은 신경병적 임상 증상의 발생과 진전에 중대한 위험인자로 관찰되었으므로 이 약의 치료효과를 방해할 수 있다. 따라서 당뇨병성 다발성 신경병증 환자는 가능한 한 알콜섭취를 피해야 하며 이것은 휴약기간에도 적용된다.
4. 상호작용
 1) 이 약과 동시투여로 인해 Cisplatin 의 효과가 경감될수 있다.
 2) α-lipoic acid는 금속화합물(철, 마그네슘을 포함하는 제제, 우유(칼슘함유 등)과 동시에 복용했을 때 체내에서 불용성 착체를 형성하므로 동시 복용하지 않는다. 만약, 이 약을 아침 식사 30분 전에 복용하였다면, 철과 마그네슘제제는 점심이나 저녁에 복용한다.
 3) 이 약과 동시 투여로 인해 인슐린이나 다른 경구 당뇨병약의 혈당 감소 작용이 증가 될수 있으므로 이와 같은 경우 특히 치료 초기에 혈당치에 대한 규칙적인 monitoring이 추천된다.
 저혈당증을 피하기 위하여 인슐린이나 경우용 당뇨병약의 투여량을 줄여야 할 경우도 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 1) 생식 독성 연구 결과 수정률이나 초기 태아 발달에 이 약이 영향을 끼친다는 증거는 없었으며, 태아 독성도 불명확하다.
 2) α-lipoic acid가 모유 중으로 분비되는지에 대해선 알려진 바 없다.
 3) 임부 및 수유부에 대해서는 약물의 유익성과 위험성을 평가한 후 투여해야 하며, 의사가 긴급히 처방한 경우에 사용한다.
6. 과량투여시의 처치
 α-lipoic acid로 10-40g에 해당하는 양을 알콜과 함께 경구 복용한 후 때때로 치사 상태를 유발하는 심각한 중독 증상이 관찰된 바 있다.
 중독의 임상증상은 초기에 전신운동성 불안 혹은 의식불명으로 나타나며, 더 심한경우, 전신발작과 유산 산증이 전형적으로 나타난다. 저혈당증, 쇼크, 횡문근변성, 용혈, 산재성 혈관내 응고(DIC), 골수억제, 다기관 부전이 α-lipoic acid의 고용량 중독으로 나타났다.
 이 약으로 인한 중독(성인의 경우 600mg 10정 이상, 소아의 경우 체중 킬로그램당 50mg 이상)이 조금이라도 의심스러울 경우, 즉시 입원하여 일반적인 중독치료를 실시해야 한다.(구토유도, 위장 관주요법, 활성탄 투여 등) 전신발작, 유산 산증 등 치사적인 중독 상태의 치료시엔 현대에 중점적으로 이루어지는 치료 원리에 따라 증상 치료를 해야 한다. 현재 α-lipoic acid의 배설을 촉진하기 위한 혈액투석, 혈액관류 혹은 여과기술에 대한 유익성은 확립되지 않았다.
7. 저장상의 주의사항
 30℃이상에서는 저장하지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】
기밀용기, 실온(1-30℃)보관　　사용기간 : 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 ~~30, 100, 500, 1000정~~ 자사포장단위.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (K.G.M.P.) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상의하십시오.

대우약품공업주식회사
서울시 서초구 방배동 807-2 부은빌딩 2층
부산광역시 사하구 신평동 579번지
소비자상담전화 051-204-3831

D0611

전문 K.G.M.P 적격업체제품

치옥티드HR 정

30정

【성분 · 함량】 1정 중
치옥트산(고시)……600mg
【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【성 상】 【효능 · 효과】 【용법 · 용량】
첨부문서 참조 「주의-부작용」

대우약품공업주식회사
부산광역시 사하구 신평동 579번지
http://www.daewoopharm.com

제조번호 :
사용기한 :

8 806105 021115