

위산과다, 위·십이지장궤양, 변비증 치료제

마그넬정

magnel Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

수산화마그네슘(USP).....500.0mg

【성상】

흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 2) 변비증

【용법·용량】

1. 성인

- 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 수산화마그네슘으로서 1일 1-2.5g을 수회 분할 복용하십시오.
- 2) 변비증 : 1일 1-2g을 1-2회 분할 복용하십시오.
· 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 복용하지 마십시오.

- 1) 신장애 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있습니다.)
- 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 복용하십시오.

- 1) 심기능장애 환자
- 2) 고마그네슘혈증 환자

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 대사이상 : 장기 대량복용에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 복용 중지 등 적절한 처치를 하십시오.

4. 일반적 주의

마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사하십시오.

5. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 함께 복용하지 않습니다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용하십시오.
- 3) 다량의 우유, 칼슘제와 함께 복용 시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아서 보관하십시오.
- 3) 잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30T, 500T

※본 의약품은 우수약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 잘 보관하여 주시고 사용(유효)기한을 반드시 확인하고 복용하여 주시기 바랍니다. 만약 사용(유효)기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입 했을때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발부로 문의하여 주시기 바라며, 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 www.wooriph.com의 각 제품란에 기재 되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

고객상담실 : 080-511-6868

첨부문서 작성년월 : 2006.11

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



제조판매원

우리팜제약주식회사

충북 제천시 왕암동 933번지 Tel 043-652-5445

고객상담실 Tel 080-511-6868