

순생약제제

베라드 정

베농산금탕엑스정

베라드정은 통증이 따르는 화농성인 종기로서 환부가 긴장하여 단단하게 굳어진 상태를 나타내는 경우에 쓰인다. 베라드정은 지실·작약·질경으로 이루어지며, 지실은 환부의 긴장을 완화하여 단단하게 굳어진 상태를 풀고 작약은 지실과 협력하여 긴장을 제거하며 통증을 경감시키고 질경은 화농을 방지하고 혹은 배농작용(고름을 밀어내는 작용)을 한다. 또한 대추·감초·생강을 배합하여 대추, 감초는 병의 진행을 더디게 해 주며 생강은 이들 여러가지 약효를 상승시키는 작용을 한다.

그러므로 절(癰: 급성 화농성 모낭염, 모낭 주위염증)

정(疔: 형태는 작으나 뿌리가 깊은 악성종기의 통칭. 뽕루지, 부스럼도 여기에 속한다.)

옹(癰: 탁한 고름이 나지만 비교적 쉽게 낫는 화농성 염증)

표저(癰疽: 일종의 급성화농성감염을 말하는데, 특히 손끝에서 많이 볼 수 있다. 비교적 맑은 고름이 나지만 통증이 극심하고 잘 낫지 않는 화농성 염증이다.)

등에 사용되는 고대 한방약으로서 소염·진통작용이 우수한 치료제입니다.

【원료약품 및 분량】 1정(600mg) 중

지 실 (약전)..... 0.50g	길 경. (약전)..... 0.67g
작 약 (약전)..... 0.50g	감 초 (약전)..... 0.50g
(패오니플로린으로서 10.0mg).	(글리시리진산으로서 12.5mg)
건 강 (약전)..... 0.165g	대 추 (약전)..... 0.50g
이상 수침건조엑스 0.284g	

【성상】 회갈색의 정제

【효능·효과】 발적·종창하여 단단해지고 동통을 수반하는 화농증.

【용법·용량】 성인 1일 3회, 1회 2~4정씩 식전 또는 식간에 복용.

【포장단위】 120정, 600정, 1200정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부포장에 표기

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 사용하지 말 것

- 1) 발적, 종창, 동통 등의 국소증상 이외에 두통, 오한, 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양, 만성종양환자

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

4. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

· 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

작성일 : 2005년 7월