



전문의약품

분류번호 :222

안전한 말초성 진해제

# 레보트로<sup>®</sup> 정

레보드로프로피진

레보트로<sup>®</sup> 정은 말초성 진해제로서 덱스트로메토르판 등의 중추성 진해제와 차별화된 작용기전을 갖고 있으며, 중추성 진해제와 비교 시 동등 이상의 효과를 나타냅니다. 또한 졸음 등의 중추 부작용이 현저히 낮고 타 약물과의 상호작용이 없는 안전한 제제입니다.

## 【성분·함량】 (1정 중)

레보드로프로피진(Levodropropizine)(별규) ..... 60mg

## 【성상】

흰색의 원형 정제

## 【효능·효과】

기침: 급·만성 기관지염

## 【용법·용량】

성인: 1회 1정(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.

이 약에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 심각한 신부전 환자

3. 이상반응

1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토

2) 중추신경계: 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증

3) 순환기계: 두근거림

4) 피부: 아주 드물게 알러지 반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작시 주의하십시오.

5. 임부 및 수유부예의 사용

임부 및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 마십시오.

## 6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

### **【저장방법 및 사용기간】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 3년

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자 피해보상 규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
  - ※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 제품문의 (02)2242-0491~9



분리배출

설명서 작성년월일 : 2007.02.07