



게프론 골드정

(코엔자임 Q10)

항산화 성분 코엔자임 Q10·영양제

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오. 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【성분·함량】 1정중

코엔자임Q10(유비데카레논)(약전)	5mg
셀레늄함유 건조효모(식약청고시 제98-127호)(셀레늄으로서 52.5 μ g)	33.871mg
아스코르빈산과립97%(별규)(아스코르빈산으로서 75mg)	77.32mg
팔미틴산레티놀과립(식약청고시 제2003-12호)(비타민A로서 2500IU)	5.0mg
초산토코페롤 50%(식약청고시 제2003-47호)(비타민 E로서 5IU)	10.0mg
산화아연(약전)(아연으로서 7.5mg)	9.35mg
황산칼륨(약전)(칼륨으로서 2.5mg)(총칼륨으로서 2.53mg)	5.57mg
에르고칼시페롤과립(식약청고시 제2003-12호)(비타민D로서 200IU)	0.236mg
질산치아민(약전)	5.0 mg
리보플라빈3배산(식약청고시 제2003-12호)(리보플라빈으로서 5mg)	15.015mg
엽산과리독신3배산(식약청고시 제2003-12호)(엽산과리독신으로서 1mg)	3.003mg
0.1% 시아노코발라민(식약청고시 제98-127호)(시아노코발라민으로서 2.5 μ g)	2.5mg
판토텐산칼슘(약전)	15.0mg
니코틴산 아미드(약전)	25.0mg
엽산(약전)	0.2mg
무수인산일수소칼슘(U.S.P.)(칼슘으로서53.5mg)(총칼슘으로서 54.71mg)	181.45mg
요오드화칼륨(약전)(칼륨으로서 46 μ g)	0.196mg
푸마르산철(U.S.P.)(철로서 7.5mg)	22.82mg
산화마그네슘(약전)(마그네슘으로서 3mg)	4.975mg
산화제이동(구리로서 1mg)(식약청고시 제98-127호)	1.25mg
황산망간일수화물(U.S.P.)(망간으로서 0.5mg)	1.54mg

【성 상】 연한 오렌지색의 타원형 필름코팅정입니다.

【효능·효과】

1. 다음의 경우 비타민 보급 : 육체피로, 임신, 수유기, 병중, 병후 체력저하시, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민등의 효과 : 눈의 건조감 완화, 야맹증, 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방, 아연(Zn)의 보급

【용법·용량】 1일 1회 2정 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용합니다.

【사용상 주의사항】

1.경고

- 1)임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민A 결핍증 환자분은 제외)
- 2)6세이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자분에는 투여하지 마십시오

- 1)과칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자분, 유육정용, 신질환 환자분 2)이 약및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자분 3)3개월미만의 영아 4)12개월 미만의 영아 5)과칼륨 혈증환자분 6)윌슨씨병 7)혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환) 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈 8)신결석환자분 9)중증의 신부전 환자분 10)임부

3. 다음 환자분은 복용전 의사 또는 약사와 상담해서 신중히 복용하십시오

- 1)1세미만의 유아 2)의사의 치료를 받고있는 환자분 3)햇빛을 많이보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오. 4)과수산뇨증 환자분(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 5)임부, 수유부 6)소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염등 위장질환이 있는 환자분

7)심장, 순환기계기능 장애 환자분 8)신장에 환자분 9)저단백혈증 환자분 10)강심배당제를 투여 중인 환자분 11)담낭관련 질환, 간질환 환자분 12)위장관 질환 13)급만성 기관지염, 폐부종 환자분 14)알카리증 소화성궤양

4. 부작용

1)이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 두드러기, 광선과민증, 복부위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부통증, 알레르기반응, 혈관부종, 관절통, 호상구증가, 요오드중독증상, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 요산과다혈증, 과칼륨혈증, 가스참, 피부염, 땀, 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화장애, 폐부종, 어지러움, 얼굴 및 다리 종창 2)이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3)에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성, 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4)장기간 고용량을 투여할경우 내성이 생길수 있습니다. 5)피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 6)엽산이 부족한 환자분에게 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다. 7)고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘 혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오. 3)1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민A로서 1일 5,000I.U.이상 넘지 않도록 하십시오.

6. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 2)이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오. 가)인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나)레보도파 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

1) 외국에서 임신전 3개월로부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부 신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울이십시오. 2) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘 혈증을 일으킬 수 있습니다. 3) 임신, 수유중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장애 및 갑상선종을 유발할 수 있습니다.

8. 임상검사치에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관하십시오.

【포장단위】 자사 포장단위 입니다. 【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 유통과정중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 소비자보호법에 의한 피해보상규정(재정경제부 고시 제 1996-3호)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※대웅제약 소비자센터(수신자 부담 전화)
: 080-550-8308~9



주식 대웅제약
경기도 화성시 향남면 상신리 906-10

설명서 작성 년월일: 2005.01.21
설명서 개정 년월일: 2005.12.15
제품의 사용기한은 외부용기에 표기
<http://www.daewoong.co.kr>