

제스판[®] 플드정

일반의약품

소화촉진/가스제거/위장기능 조절 소화제

이 약을 복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

■ **작용·특성** : 제스판플드정은 소화촉진·가스제거·위장기능 조절효과를 동시에 나타내는 소화제로서 인체의 소화에 필요한 각종 소화효소 및 성분들이 함유되어 소화력을 증강시킴으로써 소화불량, 위부팽만감, 과식, 체한, 구역, 구토 등 각종 원인으로 인한 소화장애를 신속히 개선시켜 줍니다.

1. 소화촉진작용

제스판플드정은 판크레아틴, 비오디아스타제, 프로자임 성분의 소화효소를 포함하고 있어 탄수화물, 지방, 단백질 및 섬유소의 소화, 흡수를 촉진하고 정상적인 소화기능을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

2. 가스제거작용

제스판플드정의 디메치콘은 가스의 표면장력을 저하시키는 소포제로 작용하므로 장내에 생성된 과잉의 공기, 가스, 기포를 제거하여 소화장애로 인한 식후 복통, 복부 팽만감 등을 개선시킵니다.

3. 위장기능 조절작용

제스판플드정의 염산카르니틴은 위액분비 촉진·위궤물운동 촉진·위순환혈류량 증가 등의 작용이 우수하며 지방산 산화에도 중요한 역할을 합니다.

■ 조성·성상 : 1. 원료약품의 분량 : 매 정당

비오디아스타제 700G(KPC)	50mg
프로자임(KPC)	20mg
판크레아틴II(KPC)	80mg
디메치콘파우더(별규)	83.33mg (디메치콘으로서 50mg)
DL-염산카르니틴(KPC)	100mg

2. 성상 : 녹색의 장방형 장용성 필름코팅정입니다.

■ **효능·효과** : 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량으로 인한 위부팽만감, 과식, 식체(위체), 소화촉진, 구역, 구토

■ **용법·용량** : 성인 1일 3회, 1회 1정씩 복용하십시오.

■ **사용상의 주의사항** : (1) 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

(2) 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의합니다.

(3) 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않습니다.

(4) 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관합니다.

3) 잘못된 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■ **저장방법** : 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■ **포장단위** : 제스판플드정..... 10, 100, 200, 500, 1,000정

[주의] ① 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.

② 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

③ 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입한 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품

101 - 073007



중근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)

이 설명서 작성일자(2007.10.10)이후 변경된 내용은 중근당 인터넷 홈페이지 (www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.